

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
WASHINGTON, D.C. 20460United States
Environmental Protection
AgencyOffice of Pesticide Programs

FEB 23 2007

Ms. Shelia R. Kendrick
Manager, Federal Registrations
The Scotts Company d/b/a The Ortho Group
14111 Scottslawn Rd.
Marysville, OH 43041

Subject: Amendment
Weed Be-Gone Spot Weed Killer Concentration
EPA Registration Number 239-2691

Dear Ms. Kendrick,

The amended label referred to above, submitted in connection with registration under the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act as amended, and including the revisions listed below, is acceptable. The revisions include addition of an additional brand name, "TotalKill (BRAND) Lawn Weed Killer Ready-to-Use," addition of, "The Ortho Guarantee," and addition of EPA Establishment numbers, 239-IA-3 and 58996-MO-1.

One copy of the label stamped "Accepted" is enclosed for your records. Please submit one copy of the final printed label before the product is released for shipment. If you have any questions, please contact Kathryn Montague (703-305-1243 or montague.kathryn@epa.gov).

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads "Joanne I. Miller". The signature is written in a cursive style.

Joanne I. Miller
Product Manager 23
Herbicide Branch
Registration Division (7505P)

TOTALKILL[†]

BRAND

FEB 23 2007

Under the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act as amended, for the pesticide registered under EPA Reg. No.

BY 109-2691



Lawn Weed Killer

**MATA MALEZAS
DE CESPEDES**

Ready-To-Use

• Kills Weeds, Won't Harm the Lawn!^{††}



Dandelion

Clover



Chickweed

Plantain

KEEP OFF OF SURFACE
OF CHILDREN
CAUTION
NET WT 4.0 OZ (113.4 g)

MANTENHA
ALCANCE
PRECAUCO
IN



386

MALEZAS QUE ELI MINA

Aliso, pataca, áster, radícula austriaca, cadillo, acetilla, correhuela, helenio, berro amargo de invierno, lupina, cardo santo, lechuga azul, panalillo, escobilla, plantago, cardo negro, bardana, ambrosia arragosa/artemisa, celidonia menor, cardo canadiense, anicillo, hierba del gato, estalafia, achicoria, trébol, abrojo, abrojo, sesbania común, sesbania herbacea, borrago/achicoria, aurea, croton, magüey de agua, diente de león, lengua de vaca, verdolaga, cilantro/sauco, margarita inglesa, gordolobo, hierba de la sabiduría, verdolaga del caballo, manzanilla del cerro, mansanita, barba de chivo, vara de oro, hiedra rastrera, yerba del buey, velocilla, hierba del carpintero/hierba de las hendas, cinquillo, cd/lamo, ortiga mansa, capellanes, madre-selva, canutillo/cola de caballo, malva de Indiana, cuerepillo, hierba santa, estramonio, morenila, poligono, quenopodio sayón/cenizo, abrojo mexicano, cantúes, malva, wa, caperona, ipomea tricolor/cazahuate, cardo pendiente, mostaza, ortiga, coquillo, hieracium aurantiacum, acetilla, chirivía, mostacila brava, centella asiática, ajonjolillo, lepidio/berro de jardín, bledo (maleza), llantén, abeto venenoso, hiedra venenosa, roble venenoso, litolaca, diodia, monolepis nuttalliana, lechuga silvestre, primula, rosela francesa, verdolaga, ambrosia, trébol rojo, rosella, junco, cardo ruso, hierba de San Juan, acetilla, bolsa del pastor, persicaria, hierba del estomudo, rosa silvestre sureña, chicalotillo, aguja española, nenúfar, verónica, tártago, yerba de pelo, carrasque, pamplina, zumaque, girasol (maleza), trébol de olor, Santa Susana, cardo, linaria (maleza), cardo ruso, yuca de china, verónica, verberna, ebo, diodia de Virginia, hiedra de Virginia, áster silvestre, zanañoria silvestre, puero de viña/ajo de oso, geranio silvestre, lechuga silvestre, cebolla silvestre, rábano silvestre, coza silvestre, fresa silvestre, camotillo, sauce, maleza de la bruga, agritos, epazote, milenrama, berro silvestre y otras malezas de hoja ancha

ALMACENAMIENTO

Gire la boquilla del rociador a "OFF". Evite que se congele. Mantenga los pesticidas en su envase original. No lo ponga en contenedores de comida o de bebidas. Evite la contaminación de comestibles y alimentos para animales. Almacenar en un lugar fresco, seco, preferiblemente en un área de almacenamiento bajo llave.

ELIMINACION DEL ENVASE:

Si está vacío: No vuelva a usar este envase. Tírelo a la basura o, si está disponible, ofrézcolo para reciclaje.

Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia de desechos sólidos o al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

AVISOS DE PRECAUCION

RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS PRECAUCION

Evite la inhalación de vapor de rocío y el contacto con los ojos o ropa. Es dañino si se traga o absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada en los ojos. Use pantalones largos, camisa de manga larga, calcetines, zapatos y guantes resistentes a químicos al manipular o aplicar este producto. Después de usar este producto, lave completamente los guantes no desechables con agua y jabón antes de quitárselos, quítese la ropa y lávela por separado antes de volverla a usar, y lávese las manos y la piel expuesta rápida y completamente con agua y jabón. Quítese la ropa mojada lo más pronto posible y dúchese. No permita que ninguna persona (que no sea quien lo aplica) o mascota esté en el área de tratamiento durante la aplicación.

TOTAL KILL
BRAND



OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

Lawn Weed Killer

Ready-To-Use

PRODUCT FACTS

WEEDS KILLED Controls dandelions, clover, chickweed, plantain, spurge and other listed broadleaf weeds.

WHERE TO USE ON RESIDENTIAL LAWNS—Bahigrass, bentgrass, bermudagrass, centipedegrass, fescue, Kentucky bluegrass, perennial ryegrass, St. Augustinegrass and zoysiagrass without harming lawn grasses. **DO NOT USE on Floratam Lawns.**



Questions, Comments or Medical Information
Preguntas, Comentarios o Información Médica
1-888-736-1069

Isomer Specific AOAC Method. Equivalent to:

* 2,4-D Acid	0.270% 0.022 lbs/Gallon
** Mecoprop p Acid	0.135% 0.011 lbs/Gallon
*** Dichlorprop p Acid	0.135% 0.011 lbs/Gallon

CONTAINS THE SINGLE ISOMER FORMS OF MECOPROP p AND DICHLORPROP p



Manufactured for **The ORTHO Group**
P.O. Box 190, Marysville, OH 43040
Form LBXXXXXXX
EPA Reg. No. 739-7691
EPA Est. No. 239-1A-31, 58996-MO 1A
Superscript is first letter of lot number Made in USA



0 71549 05320 8
1010

ACCEPTED


Under the Federal Insecticide,
Fungicide, and Rodenticide Act
as amended, for the pesticide
registered under EPA Reg. No.

239-2691

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT. USE STRICTLY IN ACCORDANCE WITH LABEL PRECAUTIONARY STATEMENTS AND DIRECTIONS.

 People and pets may enter treated areas after spray has dried.

SHAKE WELL BEFORE USING

HOW TO APPLY

- Turn sprayer nozzle to open.
- Adjust sprayer nozzle as desired.
- Aim at center of weed and spray until foliage is wet.

WHEN TO USE

- Use whenever weeds are actively growing in your lawn.
- The best time to apply is in the spring when weeds are small and actively growing with temperatures below 90°F.
- Winter weeds grow in the fall. An application then can prevent many serious weed problems the following spring.

FOR BEST RESULTS

- Do not mow for 1 to 2 days before or after application.
- If lawn needs watering, water thoroughly before application.
- Rain or watering 2 hrs after application will not wash away effectiveness.
- Do not apply if rainfall is expected within 2 hours.
- After applying this product, weeds will begin to show visible signs of leaf curl within a few days. One application should be sufficient. Reapplication can be made in 3-4 weeks if the weeds have not been killed.
- Spray when air is calm to avoid any spray drift that might injure desirable plants.

IMPORTANT APPLICATION INFORMATION

- Newly seeded lawns can be sprayed after first mowing.

- Bare spots can be planted with grass seed 3-4 weeks after application.
- Do not use this product for controlling weeds around ornamental shrubs, trees or plants; keep spray off foliage and exposed roots.
- St. Augustinegrass, Centipedegrass, and Bermudagrass lawns may have delayed green-up if this product is used when lawns are emerging from dormancy in the Spring or when temperature drops below 45°F within 72 hours of application.
- Do not spray on Carpetgrass, Dichondra, or desirable Clover lawns.
- Do not use on or around fruits, vegetables, or flowers.
- St. Augustine lawns may be yellowed following application but will turn green in 2 to 3 weeks. **DO NOT USE ON Floratam, a variety of St. Augustinegrass.**
- Some hybrid Bermuda grasses may be sensitive to this product. Contact your local Extension Service weed control specialist.


WEEDS KILLED

Alders, arichoke, aster, Austrian fieldcress, beggartick, biden, bindweed, bitterweed, bitter winter cress, black medic, blessed thistle, blue lettuce, box elder, broomweed, buckhorn, bull thistle, burdock, bur ragweed, buttercup, Canada thistle, carpetweed, catnip, chickweed, chicory, clover, cockle, cocklebur, coffeebean, colleweed, common sowthistle, creeping Jenny, croton, curly indigo, dandelion, dock, dogbane, dogfennel, elderberry, English daisy, flea bane (daisy), flaxweed, Florida pusley, frenchweed, galinsoga, goatsbeard, goldenrod, ground ivy, gumweed, hawkweed, healall, heartleaf drymary, hemp, henbit, hoary cress, honeysuckle, horsetail, Indiana mallow, ironweed, jewelweed, Jimsonweed, kochia, knotweed, lambsquarters, locoweed, lupines, mallow, marshelder, Mexicanweed, morningglory. (continued)

INSTRUCCIONES

Es una violación a la ley Federal usar este producto de forma inconsistente con su etiqueta.

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. USELO ESTRICTAMENTE DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN E INSTRUCCIONES.

 Las personas y mascotas pueden entrar a las áreas tratadas después de que se haya secado el rocío.

AGITE BIEN ANTES DE USAR

COMO APLICAR

- Gire la boquilla del rociador hacia la posición abierta.
- Ajuste como desee la boquilla del rociador.
- Apunte al centro de la maleza y rocíela hasta que el follaje esté mojado.

CUANDO USAR

- Use siempre que las malezas estén creciendo activamente en su césped.
- El mejor momento para aplicar es en la primavera cuando las malezas son pequeñas y están creciendo activamente a temperaturas abajo de 90°F.
- Las malezas de invierno crecen en el otoño. Una aplicación en ese momento puede prevenir muchos problemas serios en la siguiente primavera.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

- No corte la grama 1 ó 2 días antes o después de la aplicación.
- Si el césped necesita riego, deberá regar completamente antes de la aplicación.
- La lluvia o regar 2 horas después de la aplicación no se llevarán la efectividad.
- No aplique si se espera lluvia dentro de las siguientes 2 horas.

- Después de aplicar este producto las malezas empezarán a mostrar signos visibles de hojas rizadas a los pocos días. Una aplicación deberá ser suficiente. Puede volverse a aplicar en 3-4 semanas si las malezas no han desaparecido.

- Debe rociar cuando el aire esté tranquilo para evitar cualquier rocío o la deriva que pueda dañar otras plantas ornamentales que si desee conservar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA APLICACIÓN

- Los céspedes recién sembrados pueden rociarse después de cortar la grama la primera vez.
- Las áreas vacías pueden sembrarse con semillas de grama 3-4 semanas después de la aplicación.
- No use este producto para el control de malezas alrededor de arbustos, árboles o plantas ornamentales, evite rociar el follaje y las raíces expuestas.
- Se puede retrasar el reverdecimiento de los céspedes de grama San Agustín, grama ciempiés y grama Bermuda si se usa este producto cuando los céspedes están emergiendo del periodo de latencia en primavera o cuando la temperatura baje de 45°F en las siguientes 72 horas después de la aplicación.
- No debe rociar en grama alfombra, oreja de ratón/dichondra o en céspedes de tréboles que no desea eliminar.
- No lo use en o alrededor de frutas, vegetales o flores.
- Los céspedes de grama San Agustín pueden ponerse amarillos después de la aplicación pero se pondrán verdes en 2 a 3 semanas. **NO USAR EN Floratam, una variedad de la grama San Agustín.**
- Algunas gramas Bermuda híbridas pueden ser sensibles a este producto. Comuníquese con el especialista de control de malezas de su Servicio de extensión local.

ACCEPTED

Under the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act as amended, for the pesticide registered under EPA Reg. No.

239-2691

WEEDS KILLED (continued)

musk thistle, mustard, nettle, nutgrass, orange hawkweed, oxalis, parsnip, pennycress, pennywort, peppergrass, pepperweed, pigweed, plantain, poison hemlock, poison ivy, poison oak, pokeweed, porpoa, povertyweed, prickly lettuce, primrose, puncture vine, purslane, ragweed, red clover, red sorrel, rush, Russian thistle, St. Johnswort, sheep sorrel, shepherdspurse, smartweed, sneezeweed, Southern wild rose, sowthistle, Spanishneedle, spatterdock, speedwell, spurge, spurweed, stinkweed, stitchwort, sumac, sunflower, sweet clover, tarweed, thistle, toadflax, tumbleweed, velvet leaf, Veronica, vervain, vetch, Virginia buttonweed, Virginia creeper, wild aster, wild carrot, wild garlic, wild geranium, wild lettuce, wild onion, wild radish, wild rape, wild strawberry, wild sweet potato, willow, witchweed, woodsorrel, wormseed, yarrow, yellow rocket, and other broadleaf weeds.

STORAGE & DISPOSAL

STORAGE: Turn sprayer nozzle to "OFF". Keep from freezing. Keep pesticide in original container. Do not put into food or drink containers. Avoid contamination of feed and foodstuffs. Store in a cool, dry place, preferably in a locked storage area.

CONTAINER DISPOSAL:

If **empty**: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available.
If **partly filled**: Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS

CAUTION
Avoid inhalation of spray mist and contact with eyes or clothing. Harmful if swallowed or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Wear long pants, long-sleeved shirt,

socks, shoes and chemical resistant gloves when handling or applying this product. After using this product, wash nondisposable gloves thoroughly with soap and water before removing, remove clothing and launder separately before reuse, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water. Remove saturated clothing as soon as possible and shower. Do not allow people (other than applicator) or pet on treatment area during application.

FIRST AID STATEMENT

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 to 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to aquatic invertebrates. Drift or runoff may adversely affect aquatic invertebrates and non-target plants. Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters nor pour the washwater on the ground; spray or drain over a large area away from wells and other water sources and desirable plants. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purposes. If spills occur, collect the material and dispose of by following disposal instructions on this label.

NOTICE: Buyer assumes all risk of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

The ORTHO Guarantee:

If for any reason you are not satisfied with this product, mail us proof of purchase to obtain a full refund of your purchase price.

TOTAL KILL
BRAND

BY
ORTHO

Mata malezas de céspedes

Listo para usar

DATOS DEL PRODUCTO

MALEZAS QUE ELIMINA Controla el diente de león, trébol, estalaria, llantén, tártago y otras malezas de hoja ancha que aparecen en el listado.

DONDE USAR EN CESPEDES RESIDENCIALES: grama Bahía, grama Bent grass, grama Bermuda, grama ciempiés, cañuela, pasto azul de Kentucky, raigrás perenne, grama San Agustín y grama Zoysia sin dejar las gramas de céspedes. **NO DEBE USARSE en céspedes de Floratam.**



Questions, Comments or Medical Information
Preguntas, Comentarios o Información Médica
1-888-736-1069

ACCEPTEL

Under the Federal Insecticide
Fungicide, and Rodenticide Act
as amended, for the pesticide
registered under EPA Reg. No

239-2691

AVISO DE PRIMEROS AUXILIOS +

SI ENTRA EN LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuague con agua despacio y con cuidado de 15 a 20 minutos. Si tuviera lentes de contacto, quítelos después de lavarse con agua los primeros cinco minutos y después continúe lavando el ojo. Llame al centro de control de envenenamiento o al médico para obtener más recomendaciones de tratamiento.

SI EXISTIERA CONTACTO CON LA PIEL O CON LA ROPA: Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua durante 15 a 20 minutos. Llame al centro de control de envenenamiento o al médico para obtener más recomendaciones de tratamiento. Tenga a la mano el envase del producto o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o al buscar tratamiento.

RIESGOS AMBIENTALES
Este producto es tóxico para los invertebrados acuáticos. El líquido a la deriva

o la salida o flujo por tierra puede afectar en forma negativa a los invertebrados acuáticos y a las plantas que no son el objetivo. No lo aplique directamente al agua. No contamine el agua al deshacerse de la que usó para limpiar el equipo así como tampoco vierta esa agua en el suelo; rocíela o drene sobre un área grande lejos de pozos y otras fuentes de agua y plantas que no desee eliminar. No contamine el agua que se usa para irrigación o para uso doméstico. Si ocurren derrames, recoja el material y elimínelo siguiendo las instrucciones en esta etiqueta.


ADVERTENCIA: El comprador asume todos los riesgos de uso, almacenamiento o manejo de este producto si no se siguen las instrucciones.

La Garantía ORTHO:
Si por cualquier razón usted no está satisfecho con este producto, envíenos por correo el comprobante de venta para recibir un reembolso total del precio de compra.

ACCEPTED

Under the Federal Insecticide,
Fungicide, and Rodenticide Act
as amended, for the pesticide
registered under EPA Reg. No.

239-2691

 **Questions, Comments or Medical Information**
Preguntas, Comentarios o Información Médica
1-888-736-1069

© 2006, Licensed by The ORTHO Group. World rights reserved.

Manufactured for **The ORTHO Group**
P.O. Box 190, Marysville, OH 43040

Form LBXXXXXXXX
EPA Reg. No. 239-2691
EPA Est. No. 239-1A-3¹, 58996-MO-1^A
Superscript is first letter of lot number
Made in USA

PRESS TO RESEAL PRESIONE PARA VOLVER A CERRAR