

A PRENTISS PEST-TESTED PRODUCT



DIAZINON AG500 INSECTICIDE

ACTIVE INGREDIENTS:

| | |
|---|---------------|
| O,O-diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate | 48.0% |
| Xylene | 39.0% |
| INERT INGREDIENTS: | 13.0% |
| TOTAL: | 100.0% |

INGREDIENTES ACTIVOS:

| | |
|---|---------------|
| O,O-diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate | 48.0% |
| Xylene | 39.0% |
| INGREDIENTES INERTES: | 13.0% |
| TOTAL | 100.0% |

WARNING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

AVISO

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PARA EL CONTROL DE CIERTOS INSECTOS EN LA CANA DE AZUCAR, TABACO Y PINAS

CANA

Afidos. Aplicar 1 1/2-1 pinta por acre. Esperar 1 día entre la última aplicación y la cosecha. El bagazo y planta puede darse de alimento al ganado. **Tijerillas.** Larvas de los Elatéridos. Aplicar 1 gal. por acre en una banda de 12 pulgadas centrada sobre la zanja. Hacer aplicación directamente a los trozos en la zanja abierta al tiempo de cubrirlos.

TABACO

Afidos, Pulga Negra. Aplicar 1 1/2-3 1/4 pinta por acre. No aplicarse dentro de 3 días de la cosecha. **Langosta.** Aplicar 1 pinta por acre. No aplicarse dentro de 14 días de la cosecha. **Orugas Cortadoras.** Asperjar 2-3 qts. por acre antes de trasplantar y trabajar en la tierra 2-4 pulgadas inmediatamente. **Changas.** Asperjar 1 qt. por acre cuando los insectos estén presentes. Hacer aplicación a los macizos o campos sembrados 1-2 días antes de la siembra de semillas o de trasplante y trabajar dentro de 1-2 pulgadas inmediatamente. **Gusano de la Semilla del Maíz.** Asperjar 3 pts. por acre en la semilla cuando se trasplante. Trabajar dentro de 2 pulgadas inmediatamente. **Tijerillas.** Larvas de Elatéridos. Aplicar 2-3 pinta por acre en las zanjas antes de trasplantar. Trabajar dentro de 2 pulgadas inmediatamente.

PINAS

Querosas. Aplicar 1 pinta por acre en un momento de la cosecha. **Chinches Harinosas.** Aplicar 1/2 pinta por acre en un momento de la cosecha. **Chinches Harinosas.** Aplicar 1/2 pinta por acre en un momento de la cosecha. **Chinches Harinosas.** Aplicar 1/2 pinta por acre en un momento de la cosecha.

FOR CONTROL OF CERTAIN INSECTS ON SUGAR CANE, TOBACCO & PINEAPPLES

SUGAR CANE

Aphids. Apply 1 1/2-1 pint per acre. Allow 1 day between last application and harvest. Bagasse and forage may be fed to livestock. **Wireworms:** Apply 1 gallon per acre in a 12-inch band centered over the furrow. Make application directly to seed pieces in open furrow at covering time.

TOBACCO

Aphids, Flea Beetles. Apply 1 1/2-3 1/4 pint per acre. Do not apply within 3 days of harvest. **Grasshoppers:** Apply 1 pint per acre. Do not apply within 14 days of harvest. **Cutworms:** Broadcast 2-3 quarts per acre before transplanting and work into the soil 2-4 inches immediately. **Mole Crickets.** Broadcast 1 quart per acre when insects are present. Make application to beds or fields 1-2 days prior to sowing of seed or transplanting and work into soil 1-2 inches immediately. **Seed-Corn Maggots:** Broadcast 3 pints per acre 3-4 weeks before transplanting. Work into soil 2 inches immediately. **Wireworms.** Broadcast 2-3 quarts per acre, 3-4 weeks before transplanting. Work into soil 6-9 inches immediately.

PINEAPPLES

Scales. Apply 5 quarts of Diazinon AG-500 plus 2 gallons of light or medium horticultural oil in 500 gal. of water per acre to the vegetative slips on the plants following harvest of pineapple. **Mealybugs.** Apply 2 quarts per acre in a minimum of 100 gallons of water. May be applied on day of harvest. Pineapple forage and refuse may be fed to livestock 7 days following last application.

NET CONTENTS
CONTENIDO NETO

1

GALLON
GALON

E.P.A. Reg. No. 611-159
P.P.R. No. 23-0007-20

1973

DIAZINON AG500 INSECTICIDE

ACTIVE INGREDIENTS:

| | |
|---|---------------|
| D-diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate | 48.0% |
| Diethyl phosphorothioate | 39.0% |
| INERT INGREDIENTS | 13.0% |
| TOTAL: | 100.0% |

ACTIVE INGREDIENTS:

| | |
|---|---------------|
| D-diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate | 48.0% |
| Diethyl phosphorothioate | 39.0% |
| INERT INGREDIENTS | 13.0% |
| TOTAL: | 100.0% |

WARNING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

AVISO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONTENTS 1 GALLON
CONTENIDO NETO 1 GALON

E.P.A. Reg. No. 655-459
P.R. Reg. No. 73-007-20

**KEEP OUT
OF REACH
OF CHILDREN**

MAY BE FATAL IF SWALLOWED. MAY BE ABSORBED THROUGH SKIN. DO NOT BREATHE SPRAY MIST. DO NOT GET IN EYES, ON SKIN OR ON CLOTHING. WASH THOROUGHLY AFTER HANDLING. AVOID CONTAMINATION OF FOOD. DO NOT USE ON HUMANS OR PERMIT CHILDREN TO GO ON TO SPRAYED GRASS UNTIL SPRAY HAS COMPLETELY DRIED. KEEP OUT OF REACH OF DOMESTIC ANIMALS. DO NOT CONTAMINATE FEED OR USE ON HOUSEHOLD PETS OR LIVESTOCK. DO NOT PERMIT PETS TO GO ON TO SPRAYED GRASS UNTIL SPRAY HAS COMPLETELY DRIED.

This product is toxic to fish and wild life. Birds feeding in treated areas may be killed. Keep out of any body of water. Do not apply when weather conditions favor drift from areas treated or where run-off is likely to occur. Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of waste. Apply this product only as specified on this label. This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or drifting particles. If treatment of ornamentals may be required, consult the Cooperative Agr. Entomologist.

DO NOT REUSE EMPTY CONTAINER. DESTROY BY PERFORATING OR CRUSHING AND BURYING IN A SAFE PLACE.

DO NOT USE, POUR, SPILL OR STORE NEAR HEAT OR OPEN FLAME.

FLAMMABLE MIXTURE



**MANTIENGASE
FUERA
DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

PUEDE SER FATAL SI SE TRAGA. PUEDE SER ABSORBIDA A TRAVES DE LA PIEL. NO RESPIRE EL NEBLON. PERMITA QUE CAIGA EN CUERPO. LAVESE BIEN DESPUES. LAVESE CUIDADOSAMENTE DESPUES DE USARSE. EVITESE CONTAMINACION DE ALIMENTOS. NO USARSE EN SERES HUMANOS NI EN NIÑOS. EN LA HIERBA ROCIADA HASTA QUE EL ROCIADO ESTE COMPLETAMENTE SECO. MANTIENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS ANIMALES DOMESTICOS. NO CONTAMINE ALIMENTOS PARA ANIMALES. NO USE EN ANIMALES CASEROS O GANADOS. NO PERMITIR ANIMALES CASEROS EN LA HIERBA ROCIADA HASTA QUE EL ROCIADO ESTE COMPLETAMENTE SECO.

Este producto es tóxico para los peces y la vida silvestre. Las aves que se alimentan en áreas tratadas pueden morir. Manténgase fuera de cualquier cuerpo de agua. No aplique cuando las condiciones favorezcan la deriva de las áreas tratadas o donde el rebalse es probable. No contamine el agua al limpiar el equipo o al disponer de los residuos. Aplique este producto solo como se especifica en esta etiqueta. Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o a las partículas que se desprenden. Si se requiere el tratamiento de ornamentos, consulte al Entomólogo Cooperativo.

NO VOLVER A USAR EL ENVASE VACIO. DESTROYALO PERFORANDOLO O APLASTANDOLO Y ENTERRANDOLO EN UN LUGAR SEGURO.

NO SE USE O GUARDE CERCA DEL FUEGO O LLAMA VIVA

MEZCLA COMBUSTIBLE