

# Franklin®

## MAINTENANCE PRODUCTS

# PHENOMYSAN

## *Detergente Tuberculocida • Germicida*

**AVISO:** Póngalo fuera del alcance de los niños. Causa irritación en los ojos, la piel. No lo ponga en contacto con los ojos, la piel, ni la ropa. Resulta dañino cuando se traga. Evite la contaminación de los alimentos. Después de usar, lave el envase cuidadosamente con agua y descártelo.

**ANTIDOTO:** En caso de contacto, enjuague inmediatamente los ojos o la piel con agua abundante durante 15 minutos como mínimo. En el caso de los ojos, llame al médico. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. En el caso de que se trague, beba en seguida gran cantidad de agua. No use alcohol. Llame al médico inmediatamente.

### INGREDIENTES ACTIVOS:

p-Clorofenol-o-benflíco	2.6%
p-Amilfenol terciario	2.3%
2,2' Metileno-bis (3, 4, 6-triclorofenol)	0.2%
Acido hidroxietililenodiamino-triacético, sal trisódica	0.8%
p-Fenilfenol	1.3%
Dodecilbenzolsulfonato lineal potásico	5.5%
Alcohol isopropílico	9.9%
2-metil-2, 4-pentanodiol	2.0%
INGREDIENTES INERTES:	75.4%

# F250026

in  
DUCTS

# PHENOMYSAN

• *Germicida*

**INGREDIENTES ACTIVOS:**

o-Clorofenol-o-benflico	2.6%
o-Amilfenol terciario	2.3%
1,2' Metileno-bis (3, 4, 6-triclorofenol)	0.2%
ácido hidroxietilendiamino-triacético, sul trisódica	0.8%
o-Fenilfenol	1.3%
Dodecilbenzolsulfonato lineal potásico	5.5%
Alcohol isopropílico	9.9%
2-metil-2, 4-pentanodiol	2.0%
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	<b>75.4%</b>

## LUGAR Y MANERA DE USARLO


Para limpiar y desinfectar pisos, salas de enfermos, salas de operación, duchas y salas de casilleros, y en todos los lugares donde haya mucha contaminación de manchas y bacterias; en hospitales, clínicas de reposo, casas de convalecencia, hoteles, moteles, escuelas y edificios de oficinas. Se recomienda para uso en pisos conductivos. Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, no perjudica al ladrillado resiliente, ni a los pisos venecianos, ni a las superficies pintadas o barnizadas. Aplíquelo frotando, fregando o restregando, y humedeciendo bien la superficie con la dilución recomendada para el caso.

## DILUCIONES RECOMENDADAS

Para cualquier clase de limpieza y desinfección en general, incluyendo zonas de tuberculosis, 1 galón de agua y 1½ onzas fluidas de Phenomysan. Cuando se sospeche la presencia de *Psuedomonas aeruginosa*, use una porción por cada 15 porciones de agua.

Fosforoso como P 0.63%, como TSP 3.32%.

Gramos de P por uso recomendado 0.29.



# Franklin<sup>®</sup>

## MAINTENANCE PRODUCTS

# PHENOMYSAN

## *Tuberculocidal • Germicidal Detergent*

**WARNING:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Causes eye or skin irritation. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Harmful if swallowed. Avoid contamination of food. Rinse empty container thoroughly with water and discard it.

**ANTIDOTE:** In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 minutes. For eyes, call a physician. Remove and wash contaminated clothing before reuse. If swallowed, drink promptly a large quantity of water. Avoid alcohol. Call a physician immediately.  
E.P.A. Reg. No. 1124-40-AA

### F250026

#### ACTIVE INGREDIENTS:

o-Benzyl-p-chlorophenol	2.6%
p-tert-Amylphenol	2.3%
2, 2'-Methylenebis (3, 4, 6-trichlorophenol)	0.2%
Hydroxyethylethylenediaminetriacetic acid, trisodium salt	0.8%
o-Phenylphenol	1.3%
Potassium linear dodecylbenzenesulfonate	5.5%
Isopropyl alcohol	9.9%
2-Methyl-2, 4-pentanediol	2.0%

#### INERT INGREDIENTS:

75.4%

**n**  
**ACTS**

# **YSAN**

## **/ Detergent**

**ACTIVE INGREDIENTS:**

benzyl-p-chlorophenol	2.6%
tert-Amylphenol	2.3%
2,4,6-Trichloro-methylenebis (3, 4, 6-trichlorophenol)	0.2%
Dioxyethylethylenediaminetriacetic acid, sodium salt	0.8%
Nonylphenol	1.3%
Sodium linear dodecylbenzenesulfonate	5.5%
Propyl alcohol	9.9%
1,4-Butanediol	2.0%
<b>INERT INGREDIENTS:</b>	<b>75.4%</b>

### **WHERE AND HOW TO USE**

For cleaning and disinfecting floors, sick rooms, operating rooms, shower and locker rooms, and all areas where soil and bacteria contamination are high, in hospitals, nursing homes, convalescent homes, hotels, motels, schools, and office buildings. Recommended for use on conductive floors. Harmless to resilient flooring tile, terrazzo, painted and varnished surfaces when used as directed. Apply by wiping, mopping, or scrubbing, thoroughly wetting the surface with the recommended use dilution.

### **RECOMMENDED DILUTIONS**

For all general cleaning and disinfection, including tuberculosis areas: 1 gal. water - 1½ fl. oz. Phenomysan. Where *Pseudomonas aeruginosa* is suspected of being present, use one part to 15 parts water.

Phosphorus as P - 0.63%, as TSP - 3.32%.

Grams P per recommended use 0.29.

