

UNICO PROLIN

"Ready-to-Use" Pellets

DIRECTIONS FOR USE

PROLIN rat and mouse killer contains WARFARIN, an anticoagulant chemical, and sulfaquinoxaline, an anti-bacterial agent. WARFARIN reduces the clotting ability of the blood, and upon repeated feedings causes fatal hemorrhage in rats and mice. Sulfaquinoxaline inhibits certain bacteria normally present in rats and mice which produce Vitamin K, an antidote for WARFARIN.

RATS—Place 4 to 6 ounces of pellets in dry containers distributed throughout the areas or locations rats are known to frequent or are accustomed to feed. The numbers of containers (bait stations) needed depend upon the size of the area and the population of rats—use a sufficient number of stations next to burrows and in runways so the rats do not have to search for the pellets. Inspect bait stations daily, particularly during the first week, and replenish the pellets as necessary to maintain an uninterrupted supply until all signs of feeding have stopped, usually a period of not less than 12 to 14 days.

MICE—Place 1 tablespoonful of pellets in shallow containers distributed at intervals of about every 8 feet in areas where mice or their sign have been seen. Inspect the pellets frequently and replenish as necessary in order to maintain an uninterrupted supply until all signs of feeding have stopped, at least 15 days.

SPECIAL NOTE—Always replace stale, damp, or moldy bait with fresh pellets. Burn or bury discarded bait.

If a source of continuous infestation of rats or mice prevails such as from nearby dumps or fields, permanent stations baited with the pellets should be used. Inspect the stations frequently and replace with pellets as needed.

CAUTION

Baits should be placed in areas not accessible to children, pets, wildlife and domestic animals or in tamper-proof bait boxes. A protective device may be a short length of board firmly attached at an angle to a wall, beneath which the pellets are accessible to rats and mice but not to larger animals. Short lengths of pipe or drain tile of suitable diameter also may be used.

Do not contaminate water by cleaning of equipment, or disposal of wastes. Apply this product only as specified on this label.

Keep away from humans, domestic animals, and pets.

If swallowed by humans, domestic animals, or pets, this material may reduce the clotting ability of the blood and cause bleeding. In such case, intravenous and oral administration of Vitamin K combined with blood transfusions are indicated as in the case of hemorrhage caused by overdoses of bishydroxycoumarin.

Do not reuse container. Destroy when empty.

NOTICE

Use only for the purposes and in compliance with the limitations, cautions, or warnings stated on this label.

UNICO PROLIN

Perdigones Listos para el Uso Instrucciones para el Uso

PROLIN, matador de ratas y ratones, contiene WARFARINA, un anti-coagulante químico, y sulfaquinoxalina, un agente anti-bacterial. WARFARINA reduce la capacidad de coagulación de la sangre, y en dosis repetidas, causa hemorragias mortales a ratas y ratones. Sulfaquinoxalina inhibe el desarrollo de ciertas bacterias que normalmente se encuentran en ratas y ratones, y que son productoras de Vitamina K, un antidoto contra WARFARINA.

RATAS—Coloque raciones de 4 a 6 onzas de perdigones en envases secos, distribuidos en las áreas donde afluyen las ratas en busca de alimento. El número de envases depende del tamaño del área y el grado de infestación de la misma. Mantenga suficientes estaciones accesibles a madrigueras y pasadizos. Inspeccione las estaciones diariamente, particularmente durante la primera semana, y reponga los perdigones necesarios para mantener un abasto ininterrumpido, hasta que cesen las señales de consumo, regularmente en un período no menor de 12 a 14 días.

RATONES—Prepare raciones de una cucharada de perdigones en recipientes llanos y distribúyalos a intervalos de aproximadamente 8 pies, en las áreas infestadas. Inspeccione los recipientes con frecuencia y reponga los perdigones que sean necesarios para mantener un abasto ininterrumpido de por lo menos 15 días, o hasta que haya cesado toda señal de consumo.

NOTA—Sustituya el cebo viejo, mojado o mohoso, con perdigones frescos. **QUEME O ENTIERRE EL CEBOS DESCARTADO.**

De existir fuentes de infestación continua, como basureros o terrenos adyacentes, deben mantenerse estaciones permanentes provistas de perdigones. Inspecciónelas frecuentemente y reponga los perdigones cuando sea necesario.

PRECAUCION

Los envases con perdigones (estaciones) deben ser colocados en trampas o lugares inaccesibles a niños, animales caseros, animales silvestres o domésticos. Un pedazo pequeño de madera, sujeto firmemente a un ángulo de una pared, podría resultar un buen recurso protector, detrás del cual los perdigones quedarían accesibles a ratas y ratones, mas no a animales de mayor tamaño. Algún pedazo de tubo o teja de diámetro conveniente podría servir el mismo propósito.

No contamine el agua al limpiar el equipo usado o con los desperdicios del producto. Aplique el producto únicamente en la forma en que se especifica en este marbete.

Manténgase fuera del alcance de humanos, animales domésticos y caseros. Si este producto es ingerido por humanos, animales domésticos o caseros, podría reducirles la capacidad de coagulación de la sangre y provocarles hemorragias. En tal caso, al igual que en los casos de hemorragias causadas por sobredosis de bishydroxycoumarin, se recomienda la administración intravenosa y oral de Vitamina K, en combinación con transfusiones de sangre.

Destruya los envases vacíos. No los utilice nuevamente para ningún propósito.

NOTA IMPORTANTE

Usese únicamente para los propósitos especificados, a tenor con las limitaciones, precauciones y advertencias indicadas en este marbete.

