

ACCEPTED

12-28-1973

UNDER THE FEDERAL INSECTICIDE
FUNGICIDE AND RODENTICIDE ACT
FOR THE NATIONAL PESTICIDE REGISTRATION
DIVISION REGISTERED UNDER NO. 1386-441 SUBJECT
TO ATTACHED COMMENTS.



PROLIN * Rodenticide Concentrate

DIRECTIONS FOR USE

UNICO PROLIN Rodenticide Concentrate is an anti-coagulant rat and mouse killer in concentrate form which should be mixed with a bait material suitable for rats and mice. It contains WARFARIN and sulfaquinoxaline. WARFARIN reduces the clotting ability of the blood, and upon repeated feedings, causes fatal hemorrhage in rats and mice. Sulfaquinoxaline inhibits certain bacteria normally present in rats and mice which produce Vitamin K, an antidote for WARFARIN.

MAXING BAIT — Mix thoroughly 1 part of the concentrate with 19 parts, by weight, of a bait material suitable for rats and mice. Perishable materials, such as fresh ground meat, fish, cheese, and vegetables may be used, but baits made with these materials should be replaced daily. Dogs and cats will actually search out meat and fish. Baits made with perishable materials must be placed so as to positively prevent access by pets.

RATS — Place 4 to 6 ounces of mixed bait in dry containers distributed throughout the areas or locations rats are known to frequent or are accustomed to feed. The number of containers (bait stations) needed depends upon the size of the area, and the population of rats — use a sufficient number of stations next to burrows and in runways so the rats do not have to search for the bait. Inspect bait stations daily, particularly during the first week and replenish the bait as necessary to maintain an uninterrupted supply until all signs of feeding have stopped, usually a period of not less than 12 to 14 days.

MICE — Place 1 tablespoonful of mixed bait in shallow containers distributed at intervals of about every 8 feet in areas where mice or their signs have been seen. Inspect the baits frequently and replenish as necessary to maintain an uninterrupted supply of bait for at least 15 days.

SPECIAL NOTE — Promptly replace stale, damp, or moldy bait with fresh bait. ALWAYS BURN OR BURY DISCARDED BAIT.

CAUTION

Treated baits should be placed in locations not accessible to children, pets, wildlife, and domestic animals, or in tamperproof bait boxes. A protective device may be a short length of board firmly attached at an angle to a wall, beneath which the bait is accessible to rats and mice but not to larger animals. Short lengths of pipe or drain tile of suitable diameter also may be used.

Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of wastes. Apply this product only as specified on this label.

Keep away from humans, domestic animals, wildlife, and pets.

If swallowed by humans, domestic animals, wildlife, or pets, this material may reduce the clotting ability of the blood and cause bleeding. In such cases, intravenous and oral administration of Vitamin K combined with blood transfusions are indicated as in the case of hemorrhage caused by overdoses of bishydroxycoumarin.

DESTROY EMPTY CONTAINERS. Do not reuse this container for any purpose. Burn empty containers (paper) in a hot fire, outdoors, in an isolated area. The smoke is hazardous. Stay well away from the smoke.

NOTICE

Use only for the purposes and in compliance with the limitations, cautions or warnings stated on this label.

PROLIN

Rodenticide Concentrate

Rodenticida en forma de Concentrado

For Preparation of Mixed Baits

Para la Preparación de Mezclas para Cebos

Contains WARFARIN Concentrate

Contiene Concentrado de WARFARINA

* TM of Wisconsin Alumni Research Foundation

INGREDIENTS

ACTIVE INGREDIENTS:

WARFARIN, 3-(a-acetylbenzyl)-4-hydroxycoumarin 0.5%
N'-(2-Quinoxaliny) sulfanilamide (sulfaquinoxaline) 0.5%

INERT INGREDIENTS 99.0%

Total 100.0%

Caution

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Precaución

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

See Remainder of CAUTION Statement on Side Panel

Vea ADVERTENCIAS adicionales en panel lateral

EPA Reg. No. 1386-441

Net Weight

FC - 811C - 1 - 73

1 Pound

Prod. 931

Distributed by

UNIVERSAL COOPERATIVES, INC.

ALLIANCE, OHIO 44601

PROLIN * Rodenticida en forma de Concentrado

INSTRUCCIONES PARA EL USO

UNICO PROLIN en forma de Concentrado es un ratonero y ratonero, que debe mezclarse con algún ingrediente y ratones. Contiene WARFARINA y sulfaquinoxalina. de coagulación de la sangre y, en dosis repetidas, ratos y ratones. Sulfaquinoxalina inhibe el desarrollo mente se encuentran en ratos y ratones y que son antidoto contra WARFARINA.

PREPARACION DE CEBOS — Mezcle bien 1 parte por peso, de algún ingrediente apetecible a ratos y ratones con ingredientes perecederos tales como carne, vegetales, pero estos cebos deben reemplazarse diariamente atraerán a perros y gatos. Los cebos preparados deberán ser cuidadosamente colocados para evitar el acceso de mascotas.

RATAS — Coloque raciones de 4 a 6 onzas de cebos tribuidos en las áreas donde afluyen las ratas en envases (estaciones) a utilizarse depende del tamaño de la misma. Mantenga suficientes estaciones de cebos y pasadizos. Inspeccione las estaciones diariamente una semana, y reponga los cebos necesarios para mantener un abasto ininterrumpido de cebos hasta que cesen las señales de consumo, regularmente 12 a 14 días.

RATONES — Coloque raciones de una cucharada y distribúyalos a intervalos de aproximadamente 8 pies. Inspeccione los cebos frecuentemente y repóngalos cuando se agoten. Mantenga un abasto ininterrumpido de cebos por lo menos 15 días.

NOTA — Sustituya a menudo con mezcla fresca de cebos. **QUEME O ENTIERRE LOS CEBOS DESCARTADOS.**

PRECAUCION

Las estaciones o envases con cebo deben ser mantenidos inaccesibles a niños, animales caseros, animales pequeños de madera, sujeto firmemente a un sultar un buen recurso protector detrás del cual los ratos y ratones, mas no a animales de mayor tamaño de diámetro conveniente, podría servir el mismo propósito.

No contamine el agua al limpiar el equipo usado. Aplique el producto únicamente en la forma recomendada.

Manténgase fuera del alcance de humanos, mascotas y animales domésticos.

Si este producto es ingerido por humanos, animales, podría reducirles la capacidad de coagulación de la sangre y causar hemorragias. En tal caso, al igual que en los casos de sobredosis de bishydroxycoumarin, se recomienda la administración de Vitamina K, en combinación con transfusiones de sangre.

DESTROYA LOS ENVASES VACIOS. No los utilice para otros fines. Queme, al aire libre, en un área despoblada alejado del humo. Es perjudicial.


NOTA IMPORTANTE

Use únicamente para los propósitos especificados en las instrucciones y advertencias indicadas en este material.

ACCEPTED

12-28-1973

UNDER FEDERAL INSECTICIDE
PURCHASE AND DISTRIBUTION ACT
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION REGISTERED
UNDER NO. 1386-412 SUBJECT
TO ATTACHED COMMENTS.



PROLIN

Rodenticide Concentrate

Rodenticida en forma de Concentrado

For Preparation of Mixed Baits

Para la Preparación de Mezclas para Cebos

Contains WARFARIN Concentrate

Contiene Concentrado de WARFARINA

* TM of Wisconsin Alumni Research Foundation

INGREDIENTS

ACTIVE INGREDIENTS:

WARFARIN, 3-(α -acetylbenzyl)-4-hydroxycoumarin 0.5%

N'-(2-Quinoxaliny) sulfanilamide (sulfaquinoxaline) 0.5%

INERT INGREDIENTS 99.0%

Total 100.0%

Caution

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Precaución

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

See Remainder of CAUTION Statement on Side Panel

Vea ADVERTENCIAS adicionales en panel lateral

EPA Reg. No. 1386-441

Net Weight

FC - 811C - 1 - 73

1 Pound

Prod. 931

Distributed by

UNIVERSAL COOPERATIVES, INC.

ALLIANCE, OHIO 44601

PROLIN * Rodenticida en forma de Concentrado

INSTRUCCIONES PARA EL USO

UNICO PROLIN en forma de Concentrado es un anti-coagulante, matador de ratas y ratones, que debe mezclarse con algún ingrediente que resulte apetecible a ratas y ratones. Contiene WARFARINA y sulfaquinoxaline. WARFARINA reduce la capacidad de coagulación de la sangre y, en dosis repetidas, causa hemorragias mortales a ratas y ratones. Sulfaquinoxaline inhibe el desarrollo de ciertas bacterias que normalmente se encuentran en ratas y ratones y que son productoras de Vitamina K, un antídoto contra WARFARINA.

PREPARACION DE CEBOS — Mezcle bien 1 parte del concentrado con 19 partes, por peso, de algún ingrediente apetecible a ratas y ratones. Pueden prepararse mezclas con ingredientes perecederos tales como carne molida fresca, pescado, queso y vegetales, pero estos cebos deben reemplazarse diariamente. La carne y el pescado atraerán a perros y gatos. Los cebos preparados con ingredientes perecederos deberán ser cuidadosamente colocados para evitar el acceso a ellos de animales caseros.

RATAS — Coloque raciones de 4 a 6 onzas de la mezcla en envases secos, distribuidos en las áreas donde afluyen las ratas en busca de alimento. El número de envases (estaciones) a utilizarse depende del tamaño del área y el grado de infestación de la misma. Mantenga suficientes estaciones con cebo accesibles a madrigueras y pasadizos. Inspeccione las estaciones diariamente, particularmente durante la primera semana, y reponga los cebos necesarios para mantener un abasto ininterrumpido, hasta que cesen las señales de consumo, regularmente en un período no menor de 12 a 14 días.

RATONES — Coloque raciones de una cucharada de mezcla en recipientes llanos y distribúyalos a intervalos de aproximadamente 8 pies, en las áreas infestadas. Inspeccione los cebos frecuentemente y repóngalos cuando sea necesario, para mantener un abasto ininterrumpido de por lo menos 15 días.

NOTA — Sustituya a menudo con mezcla fresca el cebo viejo, mojado o mohoso. QUEME O ENTIERRE LOS CEBOS DESCARTADOS.

PRECAUCION

Las estaciones o envases con cebo deben ser colocados en trampas o en lugares inaccesibles a niños, animales caseros, animales silvestres o domésticos. Un pedazo pequeño de madera, sujeto firmemente a un ángulo de una pared podría resultar un buen recurso protector detrás del cual los cebos quedarían accesibles a ratas y ratones, mas no a animales de mayor tamaño. Algún pedazo de tubo o teja, de diámetro conveniente, podría servir el mismo propósito.

No contamine el agua al limpiar el equipo usado o con los desperdicios del producto. Aplique el producto únicamente en la forma en que se especifica en este marbete.

Manténgase fuera del alcance de humanos, animales caseros silvestres o domésticos.

Si este producto es ingerido por humanos, animales caseros silvestres o domésticos, podría reducirles la capacidad de coagulación de la sangre y provocarles hemorragias. En tal caso, al igual que en los casos de hemorragias causadas por sobredosis de bishydroxycoumarin, se recomienda la administración intravenosa y oral de Vitamina K, en combinación con transfusiones de sangre.

DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS. No los utilice nuevamente para ningún propósito. Queme, al aire libre, en un área despoblada, los envases vacíos. Manténgase alejado del humo. Es perjudicial.

NOTA IMPORTANTE

Usese únicamente para los propósitos especificados, a tenor con las limitaciones, precauciones y advertencias indicadas en este marbete.