

**INSTRUCCIONES:**

Para HIGIENIZACION de platos, vajilla de cristal, utensilios de cocina, cubiertos, botellas, envases para leche, equipos de procesar alimentos y productos lácteos: Limpie con detergente adecuado, enjuague a fondo y luego sumerja en una solución higienizante hecha de dos cucharadas de SANITROL en cuatro galones de agua. Siga con un enjuague de agua potable.

Para HIGIENIZACION GENERAL Y DESODORIZACION en salas de hospitales, habitaciones de enfermos, salas de operaciones, refrigeradores, lavatorios, urinarios, conductos de lavanderías y pisos. Limpie con detergente adecuado y enjuague a fondo. Agregue una onza de SANITROL por cada galón de agua. Aplique la solución libremente sobre las superficies a ser desinfectadas o desodorizadas. Para DESINFECTAR ropa, toallas y ropa de cama: Agite durante 10 minutos en una solución conteniendo una onza de SANITROL por cada galón de agua. Sumerja la ropa completamente. Agregue toda la ropa a tratar de una sola vez. Tres galones es suficiente para 10 libras de ropa seca.

PARA CONTROL DE BACTERIAS Y HONGOS en paredes y cielo raso. Aplíquese en superficies húmedas o ligeramente mojadas. Limpie a fondo y enjuague. Luego rocíe o pase con esponja una solución conteniendo dos onzas de SANITROL por cada galón de agua. Repita la aplicación según sea necesario para mantener el control.

NOTA: No use conjuntamente con jabón o detergentes sintéticos. Los materiales a ser desinfectados deben ser primeramente LAVADOS Y ENJUAGADOS A FONDO. Evite contaminación de alimentos y forrajes. Este producto llena los requisitos de criterio del Apéndice F de la Ordenanza de Leche Pasteurizada de Grado "A" Recomendaciones de 1965 del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en aguas de hasta 500 partes por millón de dureza calculadas como CaCO<sub>3</sub> cuando fueron probadas por A.O.A.C. Método Oficial para Germicidas y Detergentes Higienizantes.

**PELIGRO**

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Corrosivo. Causa daño a los ojos e irrita la piel. No lo salpique en ojos, piel ó ropa. Proteja los ojos y piel al usar este producto. Dañino si fuere ingerido. Evite contaminación de alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de contacto, lave inmediatamente los ojos o piel con abundante agua durante 15 minutos por lo menos. Para ojos, llame a un médico. Remueva y lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.


Si fuere ingerido, beba rápidamente grandes cantidades de leche, claras de huevo, solución de gelatina, o de no ser esto posible, beba grandes cantidades de agua. Llame a un médico inmediatamente.

**NOTA PARA EL DOCTOR:**

Probable daño a la mucosa puede contraindicar el uso de lavado gástrico. Puede ser necesario tomar medidas contra choque del sistema circulatorio, depresión respiratoria y convulsiones. No vuelva a usar el envase. Si fuere práctico, envíe el envase a un reacondicionador o de lo contrario enjuáguelo muy bien y perforélo para evitar usarlo nuevamente.

Agencia para la Protección del Medio Ambiente 5197-14-AA

**PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE  
REVENTA PROHIBIDA**



# SANITROL

## QUATERNARY AMMONIUM GERMICIDE SANITIZING AGENT

**For General Sanitization, Disinfection, Control of Bacteria, Mold and Elimination of Disagreeable Odors Caused by Bacteria.**

**Non-Flammable—Non-Volatile—Non-Corrosive  
to Inanimate Objects—Odorless**

### HEAVY DUTY INSTITUTIONAL CONCENTRATE

**ACTIVE INGREDIENTS:**

n-Alkyl (C <sub>14</sub> -50%, C <sub>12</sub> -40%, C <sub>10</sub> -10%) dimethyl benzyl ammonium chlorides .....	10.00%
Ethanol .....	2.25%
<b>INERT INGREDIENTS .....</b>	<b>87.75%</b>
	<b>100.00%</b>

### DANGER

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**SEE SIDE PANEL FOR FIRST AID  
AND ADDITIONAL PRECAUTIONS**

EPA Reg. No. 5197-14-AA

### KEM MANUFACTURING CORPORATION

KEM INTERNATIONAL BUILDING, TUCKER, GEORGIA 30084 U.S.A.

ATLANTA / EAST BRUNSWICK, N.J. / SAN FRANCISCO

International Plants: Canada · Costa Rica · Holland · Jamaica · Puerto Rico

### DIRECTIONS:

For SANITIZATION of dishes, glassware, cooking utensils, silverware, bottles, milk cans, dairy and food processing equipment: Clean with suitable detergent, rinse thoroughly, then dip in a sanitizing rinse made with two tablespoonfuls of SANITROL to 4 gallons of water.

For GENERAL DISINFECTION AND DEODORIZATION—Hospital wards, sickrooms, operating rooms, refrigerators, lavatories, urinals, hoppers and floors. Clean with suitable detergent and rinse thoroughly. Add 1 ounce of SANITROL to 1 gallon water. Apply solution freely over surfaces to be disinfected or deodorize.

For DISINFECTING clothes, towels and linen: Agitate for 10 minutes in a solution containing 1 ounce of SANITROL to 1 gallon of water. Completely immerse fabric. Add all fabric to be treated at one time. Three gallons is sufficient for 10 pounds of dry cloth.

For BACTERIAL and MOLD CONTROL on walls and ceilings. Apply to moisten or dampen surfaces. Clean thoroughly and rinse, then spray or sponge with solution containing 2 ounces of SANITROL per gallon of water. Repeat application as necessary to maintain control.

NOTE: Do not use in conjunction with soap or synthetic detergents. Materials to be disinfected should first be washed and RINSED THOROUGHLY. Avoid contamination of feed and foodstuffs. This product fulfills the criteria of Appendix F of the Grade "A" Pasteurized Milk Ordinance 1965 Recommendations of the U.S. Public Health Service in waters up to 500 ppm of hardness calculated as CaCO<sub>3</sub> when tested by A.O.A.C. Germicidal and Detergent Sanitizers—Official Method.

### DANGER

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

Corrosive. Causes eye damage and skin irritation. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Protect eyes and skin when handling. Harmful if swallowed. Avoid contamination of food.


### FIRST AID

In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty of water for at least 15 minutes. For eyes, call a physician. Remove and wash contaminated clothing before reuse. If swallowed, drink promptly a large quantity of milk, egg whites, gelatin solution or if these are not available, drink large quantities of water. Call a physician immediately.

### NOTE TO PHYSICIAN

Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. Measures against circulatory shock, respiratory depression and convulsion may be needed.

Do not reuse empty drum. Return to drum conditioner where practical or rinse thoroughly and perforate to prevent reuse.



**FOR INDUSTRIAL USE ONLY  
NOT FOR RESALE**

© 1273