

Formulated to aid in the control of a majority of insects that are detrimental to greens, fairways and lawns.

ACTIVE INGREDIENTS
 *Chlordane Technical
 Aromatic Petroleum Derivative Solvents
 **Malathion

INERT INGREDIENTS
 Calcium Dodecylbenzene Sulfonate
 C₁₂ Fatty Alcohol Ether

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
 See Side Panel for Additional Cautions.

HEAVY DUTY INSTITUTIONAL CONCENTRATE
 USDA Reg. No. 5197-20
 MADE IN U.S.A.

KEM MANUFACTURING CORPORATION
 INTERNATIONAL HEADQUARTERS
 KEM INTERNATIONAL BLDG., TUCKER, GA. U.S.A.

ATLANTA - BALTIMORE - CHICAGO - DALLAS - NEW YORK
 Overseas Plants in
 SAN JUAN, PUERTO RICO - KINGSTON, JAMAICA

INSTRUCCIONES:
 Trate los prados, áreas verdes y céspedes en la siguiente forma

Larvas de escarabajo e insectos hemipteros: Mezcle un galón de TURFSECT con suficiente agua para cubrir un acre. Para áreas menores, use 3 onzas por cada 1,000 pies cuadrados. Después de aplicarlo, haga penetrar en el terreno con agua para obtener control por una temporada. Para control hasta cinco años, aplíquese a razón de 2 a 4 galones de TURFSECT en suficiente agua para cubrir un acre, ó 6 a 12 onzas por cada 1,000 pies cuadrados.

Gusanos de césped: Riegue bien con agua antes de aplicar. Aplique TURFSECT a razón de 1 a 2 galones en suficiente agua para cubrir un acre. No riegue por varios días después del tratamiento.

Chinchas: Aplique TURFSECT a razón de 1 galón en suficiente agua para cubrir un acre.

Hormigas: Aplique 1/2 galón de TURFSECT, mezclado con suficiente agua para cubrir un acre.


Afidos y arañas en ornamentales: Mezcle TURFSECT a razón de 2 onzas por cada galón de agua. Rocíe abundantemente con rociador de apertura grande. Repita cuando sea necesario.

PRECAUCION:
 MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
 Dañino si es ingerido. El contacto con la piel puede causar síntomas tóxicos. Evite la inhalación de la niebla. En caso de contacto con la piel, lave con jabón y agua. Evite la contaminación de forraje y productos alimenticios. Mezcla inflamable. Mantenga lejos del calor o del fuego. MANTENGA LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS FUERA DE LA ZONA TRATADA HASTA QUE EL MATERIAL PERIETRE EN LA TIERRA CON AGUA Y EL CESPED ESTE SECO.

Mantenga fuera de depósitos y corrientes de agua. Puede matar peces. Pájaros comiendo de las áreas tratadas pueden ser dañados.

NOTA: Ciertos tipos de helechos, "Crassula" y "Canalita Juniper" pueden ser dañados por este material.

PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE



TURFSECT

Formulated to aid in the control of a majority of insects that are detrimental to greens, fairways and lawns.

ACTIVE INGREDIENTS
 *Chlordane Technical
 Aromatic Petroleum Derivative Solvents
 **Malathion

INERT INGREDIENTS
 Calcium Dodecylbenzene Sulfonate
 C₁₂ Fatty Alcohol Ether

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
 See Side Panel for Additional Cautions.

HEAVY DUTY INSTITUTIONAL CONCENTRATE
 USDA Reg. No. 5197-20
 MADE IN U.S.A.

KEM MANUFACTURING CORPORATION
 INTERNATIONAL HEADQUARTERS
 KEM INTERNATIONAL BLDG., TUCKER, GA. U.S.A.

ATLANTA - BALTIMORE - CHICAGO - DALLAS - NEW YORK
 Overseas Plants in
 SAN JUAN, PUERTO RICO - KINGSTON, JAMAICA

INSTRUCCIONES:
 Trate los prados, áreas verdes y céspedes en la siguiente forma

Larvas de escarabajo e insectos hemipteros: Mezcle un galón de TURFSECT con suficiente agua para cubrir un acre. Para áreas menores, use 3 onzas por cada 1,000 pies cuadrados. Después de aplicarlo, haga penetrar en el terreno con agua para obtener control por una temporada. Para control hasta cinco años, aplíquese a razón de 2 a 4 galones de TURFSECT en suficiente agua para cubrir un acre, ó 6 a 12 onzas por cada 1,000 pies cuadrados.

Gusanos de césped: Riegue bien con agua antes de aplicar. Aplique TURFSECT a razón de 1 a 2 galones en suficiente agua para cubrir un acre. No riegue por varios días después del tratamiento.

Chinchas: Aplique TURFSECT a razón de 1 galón en suficiente agua para cubrir un acre.

Hormigas: Aplique 1/2 galón de TURFSECT, mezclado con suficiente agua para cubrir un acre.

Afidos y arañas en ornamentales: Mezcle TURFSECT a razón de 2 onzas por cada galón de agua. Rocíe abundantemente con rociador de apertura grande. Repita cuando sea necesario.

PRECAUCION:
 MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
 Dañino si es ingerido. El contacto con la piel puede causar síntomas tóxicos. Evite la inhalación de la niebla. En caso de contacto con la piel, lave con jabón y agua. Evite la contaminación de forraje y productos alimenticios. Mezcla inflamable. Mantenga lejos del calor o del fuego. MANTENGA LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS FUERA DE LA ZONA TRATADA HASTA QUE EL MATERIAL PERIETRE EN LA TIERRA CON AGUA Y EL CESPED ESTE SECO.

Mantenga fuera de depósitos y corrientes de agua. Puede matar peces. Pájaros comiendo de las áreas tratadas pueden ser dañados.

NOTA: Ciertos tipos de helechos, "Crassula" y "Canalita Juniper" pueden ser dañados por este material.

PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE

DIRECCIONES:
 Trate los prados, áreas verdes y céspedes en la siguiente forma

Larvas de escarabajo e insectos hemipteros: Mezcle un galón de TURFSECT con suficiente agua para cubrir un acre. Para áreas menores, use 3 onzas por cada 1,000 pies cuadrados. Después de aplicarlo, haga penetrar en el terreno con agua para obtener control por una temporada. Para control hasta cinco años, aplíquese a razón de 2 a 4 galones de TURFSECT en suficiente agua para cubrir un acre, ó 6 a 12 onzas por cada 1,000 pies cuadrados.

Gusanos de césped: Riegue bien con agua antes de aplicar. Aplique TURFSECT a razón de 1 a 2 galones en suficiente agua para cubrir un acre. No riegue por varios días después del tratamiento.

Chinchas: Aplique TURFSECT a razón de 1 galón en suficiente agua para cubrir un acre.

Hormigas: Aplique 1/2 galón de TURFSECT, mezclado con suficiente agua para cubrir un acre.

Afidos y arañas en ornamentales: Mezcle TURFSECT a razón de 2 onzas por cada galón de agua. Rocíe abundantemente con rociador de apertura grande. Repita cuando sea necesario.

PRECAUCION:
 MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
 Dañino si es ingerido. El contacto con la piel puede causar síntomas tóxicos. Evite la inhalación de la niebla. En caso de contacto con la piel, lave con jabón y agua. Evite la contaminación de forraje y productos alimenticios. Mezcla inflamable. Mantenga lejos del calor o del fuego. MANTENGA LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS FUERA DE LA ZONA TRATADA HASTA QUE EL MATERIAL PERIETRE EN LA TIERRA CON AGUA Y EL CESPED ESTE SECO.

Mantenga fuera de depósitos y corrientes de agua. Puede matar peces. Pájaros comiendo de las áreas tratadas pueden ser dañados.

NOTA: Ciertos tipos de helechos, "Crassula" y "Canalita Juniper" pueden ser dañados por este material.

PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE

ACCEPTED FOR INDUSTRIAL USE ONLY
 3-13-69
 5197-20

Front Panel

NORFEM 1500

Formulated to aid in the control of a majority of insects that are detrimental to greens, fairways and lawns.

ACTIVE INGREDIENTS:..... 90%

- *Chlordane Technical
- Aromatic Petroleum Derivative Solvents
- **Malathion

INERT INGREDIENTS..... 10%

- Calcium Dodecylbenzene Sulfonate
- C₁₈ Fatty Alcohol Ether
- *Consists of octachloro-4,7-methanotetrahydroindane and related compounds.
- **0,0-Dimethyl dithiophosphate of diethyl mercaptosuccinate.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. See Side Panel for Additional Cautions.

HEAVY DUTY INSTITUTIONAL CONCENTRATE
USDA Reg. No. 5197-20

KEM MANUFACTURING CORPORATION
Kem International Building - Tucker, Ga.

Side Panel

DIRECTIONS:

Treat greens, fairways and lawns as follows:

JAPANESE BEETLE LARVAE, WHITE FRINGED BEETLE LARVAE AND WIREWORMS: Mix 1 gallon NORFEM 1500 with sufficient water to cover one acre. For lesser areas, use 3 oz. for each 1,000 square feet. After applying, wash into the soil. This will give control for one season. To give up to 5 years control, apply at the rate of 2 to 4 gallons NORFEM 1500 in sufficient water to cover one acre, or 6 to 12 oz. for each 1,000 square feet.

SOD WEB WORMS: Water thoroughly before applying. Apply NORFEM 1500 at rate of 1 to 2 gals. in sufficient water to cover one acre. Do not water for several days after treating.

CHINCH BUGS: Apply NORFEM 1500 at rate of 1 gallon in sufficient water to cover one acre.

ANTS: Apply 1/2 gallon of NORFEM 1500, mixed with enough water to cover one acre.


APHIDS AND SPIDER MITES ON ORNAMENTALS: Mix NORFEM 1500 at rate of 2 oz. per gallon of water. Spray thoroughly with a wet, coarse spray. Repeat when necessary.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Harmful if swallowed. Contact with skin can cause toxic symptoms. Avoid breathing spray mist. In case of contact with skin, wash with soap and water. Avoid contamination of feed and foodstuffs. Flammable mixture. Keep away from heat or open flame. KEEP CHILDREN AND PETS OFF TREATED AREA UNTIL MATERIAL IS WATERED INTO SOIL AND LAWN IS DRY.

Keep out of any body of water. Fish may be killed. Birds feeding on treated areas may be harmed.

NOTE: Injury may occur on certain ferns and some species of Crassula and Canalis Juniper.

ACCEPTED
3-13-69
5197-20



TURFSECT

Formulated to aid in the control of a majority of insects that are detrimental to greens, fairways and lawns.

ACTIVE INGREDIENTS..... 90%

- *Chlordane Technical
- Aromatic Petroleum Derivative Solvents
- **Malathion

INERT INGREDIENTS..... 10%

- Calcium Dodecylbenzene Sulfonate
- C₁₈ Fatty Alcohol Ether
- *Consists of octachloro-4,7-methanotetrahydroindane and related compounds.
- **0,0-Dimethyl dithiophosphate of diethyl mercaptosuccinate

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
See Side Panel for Additional Cautions.

HEAVY DUTY INSTITUTIONAL CONCENTRATE

USDA Reg. No. 5197-20

MADE IN U.S.A.

KEM MANUFACTURING CORPORATION

INTERNATIONAL HEADQUARTERS
KEM INTERNATIONAL BLDG., TUCKER, GA. U.S.A.
ATLANTA • BALTIMORE • CHICAGO • DALLAS • NEW YORK
Overseas Plants in
SAN JUAN, PUERTO RICO • KINGSTON, JAMAICA

INSTRUCCIONES:

Trate los prados, áreas verdes y céspedes en la siguiente forma:

Larvas de escarabajo e insectos hemípteros: Mezcle un galón de TURFSECT con suficiente agua para cubrir un acre. Para áreas menores, use 3 onzas por cada 1,000 pies cuadrados. Después de aplicarlo, haga penetrar en el terreno con agua para obtener control por una temporada. Para control hasta cinco años, aplíquese a razón de 2 a 4 galones de TURFSECT en suficiente agua para cubrir un acre, ó 6 a 12 onzas por cada, 1,000 pies cuadrados.

Gusanos de césped: Riegue bien con agua antes de aplicar. Aplique TURFSECT a razón de 1 a 2 galones en suficiente agua para cubrir un acre. No riegue por varios días después del tratamiento.

Chinchas: Aplique TURFSECT a razón de 1 galón en suficiente agua para cubrir un acre.

Hormigas: Aplique 1/2 galón de TURFSECT, mezclado con suficiente agua para cubrir un acre.

Arañas y arañas en ornamentales: Mezcle TURFSECT a razón de 2 onzas por cada galón de agua. Rocíe abundantemente con rociador de apertura grande. Repita cuando sea necesario.

PRECAUCION:

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIROS. Dañino si es ingerido. El contacto con la piel puede causar síntomas tóxicos. Evite la inhalación de la niebla. En caso de contacto con la piel, lave con jabón y agua. Evite la contaminación de forraje y productos alimenticios. Mezcle inflamable. Mantenga lejos del calor o del fuego. MANTENGA LOS NIROS Y ANIMALES DOMESTICOS FUERA DE LA ZONA TRATADA HASTA QUE EL MATERIAL PENETRE EN LA TIERRA CON AGUA Y EL CESPED ESTE SECO.

Mantenga fuera de depósitos y corrientes de agua. Puede matar peces. Pájaros comiendo de las áreas tratadas pueden ser dañados.

NOTA: Ciertos tipos de helechos, "Crassula" y "Canalis Juniper" pueden ser dañados por este material.

PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE

DIRECCIONES:

Treat Greens, Fairways and Lawns as follows:

Japanese Beetle Larvae, White Fringed Beetle Larvae and Wireworms: Mix 1 gallon TURFSECT with sufficient water to cover one acre. For lesser areas, use 3 oz. for each 1,000 square feet. After applying, wash into the soil. This will give control for one season. To give up to 5 years control, apply at the rate of 2 to 4 gallons TURFSECT in sufficient water to cover one acre, or 6 to 12 oz. for each 1,000 square feet.

Sod Web Worms: Water thoroughly before applying. Apply TURFSECT at rate of 1 to 2 gals. in sufficient water to cover one acre. Do not water for several days after treating.

Chinch Bug: Apply TURFSECT at rate of 1 gal. in sufficient water to cover one acre.

Ants: Apply 1/2 gal. of TURFSECT, mixed with enough water to cover one acre.

Aphids and Spider Mites on Ornamentals: Mix TURFSECT at rate of 2 ounces per gal. of water. Spray thoroughly with a wet, coarse spray. Repeat when necessary.

CAUTION:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Harmful if swallowed. Contact with skin can cause toxic symptoms. Avoid breathing spray mist. In case of contact with skin, wash with soap and water. Avoid contamination of feed and foodstuffs. Flammable mixture—keep away from heat or open flame. KEEP CHILDREN AND PETS OFF TREATED AREA UNTIL MATERIAL IS WATERED INTO SOIL AND LAWN IS DRY.

Keep out of any body of water. Fish may be killed. Birds feeding on treated areas may be harmed.

NOTE: Injury may occur on certain ferns and some species of Crassula and Canalis Juniper.

ACCEPTED
3-13-69
5197-20
UNDER THE FEDERAL INSECTICIDE ACT OF 1947
EPA REG. NO. 5197-20