

DESTRUCTOR SELECTIVO DEL PASTO DE DALLIS

PARA CONTROL DE DALLIS EN CESPED BERMUDA

DIRECCIONES PARA SU USO - Para mejores resultados la tierra debe estar mojada en el momento de la aplicación. La tierra seca no permitirá al césped resistir la acción del producto químico. Si la tierra está seca, se deberá rociar primero cada acre (usando rocío fino) con 50 gl. de agua que contengan 2 qt. de Agente Humedecedor para asistir la penetración del agua de irrigación.

PROPORCIONES RECOMENDADAS PARA TRATAR UN ACRE

Mezclar a razón de 2½ pts. MSMA-6.66 en 40 galones de agua. Mezclar completamente agitando la solución en la bomba de rocío. Para disminuir el derive y aumentar la absorción de la hoja, agregar 1 a 2 pt. de Agente Humedecedor a la mezcla. Se deberá aplicar dos o más veces cada 5-7 días. MSMA 6.66 es efectivo en las proporciones arriba mencionadas si la temperatura ambiente es 80°F. Para temperaturas debajo de 80°F habrá que duplicar la cantidad de MSMA-6.66 para tratar la misma zona.

IMPORTANTE - No regar por lo menos durante 24 horas luego del tratamiento. No se deberá usar en St. Augustine, Carpet o Centipede.

ACCEPTED

August 28, 1973

UNDER THE FEDERAL INSECTICIDE
FUNGICIDE AND RODENTICIDE ACT
FOR ECONOMIC POISON REGISTER-
ED UNDER NO. 6720-49

Comment



MSMA - 6.66

Contiene 6.66 lbs. MSMA por galón (equivalente a 12 lbs. DSMA)

INGREDIENTES ACTIVOS:

Monosodium Acid Methanearsonate	51.19%
INGREDIENTES INERTES	48.81%
TOTAL	100.00%

PRECAUCION: Mantengase fuera del alcance de los niños

E.P.A. Registration Number 6720-49



MANUFACTURED BY
Southern MILL CREEK PRODUCTS COMPANY, Inc.
TAMPA FLORIDA

ACCEPTED

August 28, 1973

THE FEDERAL INSECTICIDE
FUNGICIDE AND RODENTICIDE ACT
FOR ECONOMIC POISON REGISTER-
ED UNDER NO. 6720-49

Comment

ACCEPTED
August 28, 1973
FEDERAL INSECTICIDE
AND RODENTICIDE ACT
TOXIC POISON REGISTER
NO. 6720-49



argument **MSMA - 6.66**

Contiene 6.66 lbs. MSMA por galón (equivalente a 12 lbs. DSMA)

INGREDIENTES ACTIVOS:	
Monosodium Acid Methearsonate	51.19%
INGREDIENTES INERTES	48.81%
TOTAL	100.00%

PRECAUCION: Mantengase fuera del alcance de los niños

E.P.A. Registration Number 6720-49

Southern **MILL CREEK PRODUCTS COMPANY, Inc.**
TAMPA FLORIDA

USAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES, AVISOS Y PRECAUCIONES

Lavar el equipo con agua luego de usarlo. Antes de usar cualquier herbicida se deberá leer la etiqueta cuidadosamente.

AVISO: No permitir que el rocío se derive a flores, arbustos, árboles, vegetales o lagos y arroyos. No se deberá almacenar cerca de fertilizantes, funguicidas, insecticidas o semillas.

PRECAUCION - Evitar el contacto con la piel y los ojos. Si se derramara en la piel, lavarse inmediatamente con agua y jabón. Evitar el respirar los vapores. Evitar la contaminación de comestibles, alimentos para animales, arroyos o provisiones de agua. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Mantener al ganado fuera de las zonas tratadas. Lavarse las manos luego de usarlo.

AVISO: La garantía del vendedor se limita a los términos indicados en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos que resulten del manejo y uso de este producto y acepta el mismo dentro de estas condiciones.

ACCEPTED WITH COMMENTS

DE DALLIS


BERMUDA

La tierra debe estar
no permitirá al césped
seca, se deberá rociar
agua que contengan 2
del agua de irrigación

TAR UN ACRE

es ed agua. Mezclar
cio. Para disminuir el
pt. de Agente Hume-
cada 5-7 días MSMA
las si la temperatura
habrá que duplicar la

luego del tratamiento
de.



MSMA - 6.66

Contiene 6.66 lbs. MSMA por galón (equivalente a 12 lbs. DSMA)

INGREDIENTES ACTIVOS	
Monosodium Acid Methanearsonate	51.19
INGREDIENTES INERTES	48.81
TOTAL	100.00

PRECAUCION: Mantengase fuera del alcance de los niños

E.P.A. Registration Number 6720-49



MANUFACTURED BY
Southern MILL CREEK PRODUCTS COMPANY, Inc.
TAMPA, FLORIDA

USAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES, AVISOS Y PRECAUCIONES

Lavar el equipo con agua luego de usarlo. Antes de usar cualquier herbicida se deberá leer la etiqueta cuidadosamente.

AVISO: No permitir que el rocío se derive a flores, arbustos, árboles, vegetales o lagos y arroyos. No se deberá almacenar cerca de fertilizantes, funguicidas, insecticidas o semillas.

PRECAUCION - Evitar el contacto con la piel y los ojos. Si se derramara en la piel, lavarse inmediatamente con agua y jabón. Evitar el respirar los vapores. Evitar la contaminación de comestibles, alimentos para animales, arroyos o provisiones de agua. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Mantener al ganado fuera de las zonas tratadas. Lavarse las manos luego de usarlo.

AVISO: La garantía del vendedor se limita a los términos indicados en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos que resulten del manejo y uso de este producto y acepta el mismo dentro de estas condiciones.



AMA-2

Amine Methyl Arsonate 2, 4-D with Water Soluble
LIQUID
For Use on Ornamental Turf Grasses

ACTIVE INGREDIENTS:	
Dodecyl Ammonium Methyl Arsonate	8.00%
Octyl Ammonium Methyl Arsonate	8.00%
Octyl Ammonium Salt of	
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid	8.16%
INERT INGREDIENTS	75.84%
TOTAL	100.00%
Total Arsenic all in Water Soluble Form 4.10%	
Equivalent to 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid 5.14%	

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
SEE SIDE PANEL FOR OTHER CAUTIONS.



MANUFACTURED BY

Southern MILL CREEK PRODUCTS COMPANY, Inc.
TAMPA, FLORIDA

A SELECTIVE DALLIS GRASS DESTROYER

FOR CONTROL OF DALLIS GRASS AND OTHER

WEEDS IN BERMUDA OR ZOYSIA TURF

AMA-2 kills Dallis Grass, Red Grass, Sedge, Tenor Grass, Kills Chickweed, Dandelion, Plantain, Knotweed, Purslane, Spotted Sedge, Large Leaf Spurge, Pennywort, Begon, Weed and many others.

AMA-2 is best to use early in the morning after Dallis Grass has been cut. Seeds do not germinate at the same time. It will be necessary for one or more additional treatments at 10 to 14 day intervals.

DO NOT USE ON St. Augustine, Carpet, Centipede, or any other fine leafed Bermudagrass or Zoysia. Turf grasses which are cut will return in a few days.

DIRECTIONS FOR USE

be sure soil is moist before treatments. During dry spells, water thoroughly before making applications.

- Normal rainfall (4-6 hours) following application will not adversely affect results. Resume keeping soil moist day after application and especially during hot, dry weather, if possible.
- NEW TURF should NOT be treated until the third mowing.

RECOMMENDED RATES

Temperature Range

80-85 F	Over 85	Amount Water	Area Covered
5 fl. oz	4 fl. oz	1-2 gals	1 acre
1 1/2 gals	1 1/2 gals	40-60 gals	1/4 Acre

Note: increase chemical rate proportionately when temperatures are below 80 F.
Clean equipment after use by flushing with water. Run rinse water in area away from domestic water sources.

Before using any Herbicide, stop and read the label.

USE IN ACCORDANCE WITH DIRECTIONS,
WARNING AND CAUTION

WARNING

DO NOT spray or allow to drift onto desirable flowers, trees, shrubs, vegetables or into lakes or streams. DO NOT store near fertilizer, fungicides, insecticides or seeds.

CAUTION

DO NOT get in eyes or on the skin. If sprayed on skin, wash off immediately with warm water and soap. Flush eyes with clear water. Avoid any inhalation of spray mist. Avoid contamination of feed, foodstuffs, streams or other water sources. Keep beyond the reach of children and domestic animals. Keep livestock off treated areas. Wash hands after using. Harmful if swallowed.

ACCEPTED

ANTIDOTE

If taken internally, induce vomiting and call a physician at once.

NOTICE

Before using any herbicide, stop and read the label. The label contains important information regarding the safe use of the product. The user must read the label and accept the product on these conditions.