

PLEASE NOTE

**This image contains more than one label
approved for this product on this date.**



ACCEPTED

JAN 2 1974

UNDER THE FEDERAL INSECTICIDE
FUNGICIDE AND RODENTICIDE ACT
FOR ECONOMIC POISON REGISTERED
UNDER NO.

6720-136

SEVIN* 10 DUST

FOR USE BY PROFESSIONAL PEST CONTROL OPERATORS

ACTIVE INGREDIENTS:

Carbaryl (1-naphthyl N-methylcarbamate) 10.0%

INERT INGREDIENTS: 90.0%

TOTAL 100.0%

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

DIRECTIONS

For use by Pest Control Operators outside of buildings for the control of Ants, Brown Dog Ticks, Earwigs and Millipedes.

Dust ant trails, cracks and crevices outside of buildings. Also, try to locate nest and dust it. For centipedes and millipedes dust under stones, flower pots, boards and other debris. For the control of earwigs dust during late afternoon or early evening in a band around premises or structures. Also treat base of mulched shrubbery and flower beds. This band of dust may also prevent Brown Dog Ticks from entering buildings.

RECOMMENDATIONS

FOR INSECT CONTROL ON PLANTS

Dosages given are in amount of Sevin 10% Dust per acre. Apply when insects first threaten damage to crop and repeat at 5 to 7 day intervals as required to maintain control.

COTTON: Boll Weevil, Bollworm, Cotton Fleahopper, Lygus Bugs, Pink Bollworm, Thrips. For Early Season control use 15 lbs. per acre. Mid-Season use 15 to 20 lbs. per acre. Late Season use 20 to 25 lbs. per acre.

PEANUTS: Corn Earworm, Fall Armyworms, Potato Leafhoppers, Velvet Bean Caterpillars - Use 15 lbs. per acre. Apply when larvae are young on Corn Earworms, and Fall Armyworms. Apply when feeding by larvae is noted on Velvet Bean Caterpillars. Apply about July 10 and then at three week intervals on leafhoppers.

TOBACCO: (Plant Bed): Tobacco Flea Beetles, Green June Beetle Larvae - use 2½ lbs. per 100 sq. yd. Apply when plants appear. Repeat as needed at 10 to 14 day intervals and just before transplantings.

TOBACCO: (Field): Hornworms, Budworms, Flea Beetles, June Beetles, Japanese Beetles - use 25 lbs. per acre. Good coverage is essential. Repeat as needed. Allow 3 days before priming or cutting.

USE THIS PRODUCT ONLY AS DIRECTED ON THIS LABEL

CAUTION

Harmful if inhaled or swallowed. Avoid breathing dust. Avoid contact with skin or eyes. Wash hands thoroughly after handling and before eating or smoking. Take shower or bath after work. Wear regular long sleeved work clothing. Wash clothing in hot water and soap before re-using. Do not reuse empty container. Destroy when empty.

OBSERVE FOLLOWING USE PRECAUTIONS

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on crops. Protective information may be obtained from your Cooperative Agricultural Extension Service.



Avoid drift to adjoining food and forage crops.

Consult State Agricultural Extension Service for additional information, as the timing, number and rates of applications needed will vary with local conditions.

Apply only as specified on label.

NOTE TO PHYSICIAN: Carbaryl is a moderate, reversible, cholinesterase inhibitor. Atropine is antidotal.

NOTICE: Seller's guaranty shall be limited to the terms of the label and subject thereto. The buyer assumes any risk to persons or property arising out of use or handling and accepts the product on these conditions.

* Trademark of Union Carbide Corp.
U.S. Pat. No. 2-903-478

E.P.A. Registration Number 6720-136

NET WEIGHT: POUNDS



MANUFACTURED BY

Southern MILL CREEK PRODUCTS COMPANY, Inc.

TAMPA, FLORIDA

NEXT

LABEL



PESO NETO

ACCEPTED

JAN 2 1974

UNDER THE FEDERAL INSECTICIDE
FUNGICIDE AND RODENTICIDE ACT
FOR ECONOMIC POISON REGISTER-
ED UNDER NO.

6720-136

SEVIN 10% POLVO

PARA USO POR EXTERMINADORES PROFESIONALES

INGREDIENTES ACTIVOS:

Carbaryl (1-naphthyl N-methylcarbamate	10.0%
INGREDIENTES INERTES	90.0%
TOTAL	100.0%

PRECAUCION: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DIRECCIONES PARA SU USO

Para uso por Exterminadores profesionales afuera de los edificios para controlar Hormigas, Garrapatas, Cienpies.

Espolvorear los caminos de las Hormigas, grietas y rajaduras en las afueras de los edificios, también espolvorear los nidos si se los encuentran. Para cienpies, espolvorear debajo de las rocas, macetas, tablas y lugares similares. Espolvorear al atardecer en una banda alrededor de las estructuras. También se deberá aplicar alrededor de arbustos y canteros. Espolvoreando en banda prevendrá la entrada de las garrapatas en los edificios.

RECOMENDACIONES PARA CONTROL DE INSECTOS EN LAS PLANTAS

Las dosis que se dan son en cantidades de Sevin 10% polvo por acre. Aplicar cuando los insectos amenazan dañar la cosecha y repetir con intervalos de 5 a 7 días como se requiera para mantener el control.

ALGODON: Gorgojo, gusano, pulgón del algodón, trips. Para control al principio de la temporada usar 15 lbs. por acre. A mediados de la temporada usar 15 a 20 lbs. por acre. Al fin de la temporada usar 20 a 25 lbs. por acre.

MANI: Gusano de la oreja del maíz, gusano soldado del otoño, saltamonte de la papa, oruga. Usar 15 lbs. por acre. Aplicar cuando la larva es nueva. Aplicar alrededor de enero 10 en el hemisferio sur o julio 10 el hemisferio sur o julio 10 en el hemisferio norte, y luego cada tres semanas para saltamontes.

TABACO: (cantero de la planta) Pulgón del tabaco, escarabajo verde de junio, (larva) usar 2½ lbs. por 100 sq. yd. Aplicar cuando las plantas aparecen. Repetir cuando sea necesario entre 10 y 14 días y antes del transplante.

TABACO: (plantación): gusano de cuerno, pulgón, escarabajo japonés, usar 25 lbs. por acre. Es esencial cubrir completamente. Repetir cuando sea necesario. Permitir 3 días antes de podar.

USAR ESTE PRODUCTO SOLO DE ACUERDO A LAS DIRECCIONES EN LA ETIQUETA.

PRECAUCION - Peligroso si se ingiere o inhala. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Lavarse bien las manos después del manejo y antes de comer o fumar. Darse un baño luego de manejarlo. Usar ropa de trabajo con mangas largas. Lavar la ropa con agua caliente y jabón antes de usarla nuevamente.

No reuse los envases vacíos. Destruyalos cuando vacíos.

OBSERVAR LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES

Este producto es altamente tóxico a las abejas expuestas a tratamiento directo o residuos en las cosechas. Información protectora puede obtenerse del Servicio de Extensión Agrícola.

Evitar el derive a alimentos adyacentes y cosechas para forraje.

Consultar el Servicio de Extensión Agrícola para información adicional, ya que la época, cantidad y proporciones de aplicación variarán de acuerdo a las condiciones locales.

Aplicar sólo de acuerdo a las especificaciones en la etiqueta.

AVISO AL MEDICO: Carbaryl es un inhibidor colinesterase moderado y reversible. Atropina es un antídoto.

AVISO: La garantía del vendedor se limita a los términos indicados en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos que resulten de su uso y manejo y acepta este producto de acuerdo a estas condiciones.

E.P.A. Registration Number 6720-136



MANUFACTURED BY

Southern MILL CREEK PRODUCTS COMPANY, Inc.

TAMPA, FLORIDA