

**ROZOL
CEBOS MATA RATAS Y RATONCITOS
CASEROS (HARRIEROS)**

INSTRUCCIONES GENERALES. Puede ser usado en áreas húmedas o mojadas, según instrucciones a continuación.

BAJO TECHO. Colocar cebo en las áreas donde los roedores suelen transitar, comer o beber, detrás de maderos recostados a la pared, entre paredes y detrás de agujeros abiertos por los roedores.

A LA INTEMPERIE. Colocar cebos en las madriguera, en cloacas por encima del nivel del agua, en edificios agrícolas.

CONTRA RATAS NORUEGAS Y NEGRAS: Colocar por los menos 4 a 16 onzas de cebo en cada estación. Mantener suministro constante de cebo en estaciones durante lo menos 10 días mientras exista evidencia de roedores.

CONTRA RATONCITOS CASEROS (HARRIEROS) Colocar 1 4 1 2 onzas (cucharadas) por estación en lugares tratados de 8 a 12 pies de separación. Mantener suministro constante de cebo durante por lo menos 15 días.

Cebos contaminados o rancios deben ser retirados y repuestos prontamente. No usar el envase vacío nuevamente. Destruyase una vez vacío. Coloque cebos tratados en lugares no accesibles a los niños, animales caseros ni salvajes, o en cajas comederos selladas ancladas firmemente. No colocar el cebo en la tierra. No contaminar agua de beber lavando equipos usados o desechando cebos. Manténgase lejos de lagos, charcos o ríos. Aplicar este producto solo según especificado en las instrucciones.

Esta caja fué llenada al momento de envase. Es posible que el material se asiente en transporte.

PRECAUCION

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

Mantengase fuera del alcance de las personas y animales caseros. Si es ingerido o absorbido por las personas o animales caseros, este material reduce la coagulabilidad de la sangre y ocasiona hemorragia. En ese caso, administración por vía oral o intravenosa de dosis de Vitamina K combinadas con transfusiones de sangre son indicados como si fuera el caso de sobredosis de bishidroxicumarina. Llamar a un médico inmediatamente.

Los cebos deben ser colocados en áreas fuera del alcance de los niños, y animales caseros y salvajes, o en cajas comederos selladas ancladas firmemente.

NOTA: El comprador asume todos los riesgos de uso almacenaje o manejo de este material si no es hecho según las instrucciones arriba indicadas.


**MANTENGASE LEJOS DE LOS ALIMENTOS
ALMACENAR EN LUGAR FRESCO**

CHEMPAR CHEMICAL CO., INC.

260 Madison Avenue, New York, New York 10016

EPA REG. NO. 7173-159
EPA REG. NO. 7173-161

English on
reverse side.



**ROZOL
RAT AND MOUSE KILLER BAITS**

GENERAL DIRECTIONS: Can be used in wet and damp areas as specified below:

INDOORS: Place bait in runways, at feeding and watering areas, behind boards along walls, between walls, and behind gnawed openings.

OUTDOORS: Place bait in burrows, in sewers above high water line, and agricultural premises.

FOR NORWAY AND ROOF RATS: Place at least 4 to 16 ounces of bait per placement. Maintain constant supply of bait at stations for at least 10 days as long as there is evidence of rat population.

FOR HOUSE MICE: Place 1/4-1/2 ounce (tablespoon amounts) per placement with stations located at 8 to 12 ft. intervals. Maintain constant supply of bait for at least 15 days.

Contaminated or spoiled baits should be replaced promptly. Do not reuse empty container. Destroy when empty. Treated baits must be placed in locations not accessible to children, pets, wildlife and domestic animals, or in tamper-proof bait boxes. Do not allow treated bait to be exposed on bare ground. Do not contaminate water by cleaning of equipment, or disposal of wastes. Keep out of lakes, streams or ponds. Apply this product only as specified on this label.

PACKAGE IS FULL WHEN PACKED. SOME SETTLING MAY OCCUR IN SHIPMENT.

English on reverse side

CAUTION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Keep away from humans, domestic animals and pets. If swallowed or absorbed by humans, domestic animals or pets, this material may reduce the clotting ability of the blood and cause bleeding. In that case, intravenous and oral administration of Vitamin K combined with blood transfusions are indicated as in the case of hemorrhage caused by overdoses of bishydroxycoumarin. Call a physician immediately.

Baits must be placed in areas inaccessible to children, pets, wildlife and domestic animals or in tamper-proof bait boxes

NOTICE Buyer assumes all risks of use, storage or handling of this material not in strict accordance with directions given wherewith

**KEEP AWAY FROM FOODSTUFFS
STORE IN A COOL PLACE**

CHEMPAR CHEMICAL CO., INC.
260 Madison Avenue, New York, New York 10016

ACCEPTED
JUN 3 1977
Used in the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, as amended, for the pesticide registered under EPA Reg. No. 277-3-161