

**INSTRUCCIONES PARA EL USO Y
CONDICIONES DE VENTA Y GARANTIA**

IMPORTANTE: Antes de emplear este producto, lea por completo las instrucciones de venta y garantía.

Condiciones de Venta y Garantía

El Vendedor no garantiza el resultado de este producto si no se aplica conforme a las instrucciones indicadas en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos del uso y manejo de este producto cuando tales riesgos sean causados por no seguir las instrucciones indicadas en la etiqueta.

Información General

El Diazinon AG500 es una solución emulsificable que al diluirse en agua de acuerdo a las instrucciones abajo indicadas se usa en el control de plagas insectílicas de cultivos agrícolas. No lo use en las viviendas ni en los graneros. No lo use en el ganado. En las instrucciones de uso dadas más adelante, a menos que no se indique lo contrario, el Diazinon AG500 debe mezclarse con suficiente agua para cubrir bien toda el área a tratar. El mejor control se obtiene cuando las aplicaciones se hacen tan pronto aparecen los primeros insectos. Las aplicaciones deben repetirse a medida que se necesiten para mantener un buen control.

Instrucciones para Usarlo

Insectos Foliáres de las Hortalizas

El Diazinon AG500 debe siempre aplicarse como una aspersión en suficiente agua para asegurar que el follaje quede completamente cubierto.

Habichuelas (Trepadoras, de vaina y Habas Lima)

Los áfidos o Pulgones de las habichuelas, Minadores de las hojas. Aplicar 1 a 1 1/2 pintas por acre.

Chismelidos del Pepinillo

Aplicar 3/4 pintas en 100 galones de agua por acre.

No lo aplique durante los 7 días antes de la cosecha. El follaje de las habichuelas o el hinocho hecho de la misma planta puede darse al ganado seco y de carne, como también a las ovejas. Espere 4 días después del tratamiento si las plantas van a usarse para hacer el heno.

Bélico, Repollo y Coliflor

Áfidos o Pulgones, Mariposa del tajo de diamante, Orocas del repollo (Pieris rapae). Aplique de 1 a 1 1/2 pinta por acre. Únicamente se repagan en aspersión a intervalos de 7 a 10 días, o cuando el insecto reaparece dentro de los 7 días siguientes al tratamiento de la cosecha.

Zanahorias

Áfidos o Pulgones. Aplique de 1 a 1 1/2 pinta por acre. Únicamente se repagan en aspersión a intervalos de 7 a 10 días, o cuando el insecto reaparece dentro de los 7 días siguientes al tratamiento de la cosecha.

Repollitos

Áfidos o Pulgones. Aplique de 1 a 1 1/2 pinta por acre. Únicamente se repagan en aspersión a intervalos de 7 a 10 días, o cuando el insecto reaparece dentro de los 7 días siguientes al tratamiento de la cosecha.

Brécol y Espinaca

Áfidos o Pulgones. Aplique de 1 a 1 1/2 pinta por acre. Únicamente se repagan en aspersión a intervalos de 7 a 10 días, o cuando el insecto reaparece dentro de los 7 días siguientes al tratamiento de la cosecha.

Champiñones

Áfidos o Pulgones. Aplique de 1 a 1 1/2 pinta por acre. Únicamente se repagan en aspersión a intervalos de 7 a 10 días, o cuando el insecto reaparece dentro de los 7 días siguientes al tratamiento de la cosecha.

Lechuga

Áfidos o Pulgones. Aplique de 1 a 1 1/2 pinta por acre. Únicamente se repagan en aspersión a intervalos de 7 a 10 días, o cuando el insecto reaparece dentro de los 7 días siguientes al tratamiento de la cosecha.

Calabacín

Áfidos o Pulgones. Aplique de 1 a 1 1/2 pinta por acre. Únicamente se repagan en aspersión a intervalos de 7 a 10 días, o cuando el insecto reaparece dentro de los 7 días siguientes al tratamiento de la cosecha.

Lechuga

Áfidos o Pulgones. Aplique de 1 a 1 1/2 pinta por acre. Únicamente se repagan en aspersión a intervalos de 7 a 10 días, o cuando el insecto reaparece dentro de los 7 días siguientes al tratamiento de la cosecha.

Lechuga

Áfidos o Pulgones. Aplique de 1 a 1 1/2 pinta por acre. Únicamente se repagan en aspersión a intervalos de 7 a 10 días, o cuando el insecto reaparece dentro de los 7 días siguientes al tratamiento de la cosecha.

Lechuga

Áfidos o Pulgones. Aplique de 1 a 1 1/2 pinta por acre. Únicamente se repagan en aspersión a intervalos de 7 a 10 días, o cuando el insecto reaparece dentro de los 7 días siguientes al tratamiento de la cosecha.

que 1/2 pinta por acre. Para controlar los Minadores de las hojas, usualmente se requieren aplicaciones semanales.

Grisomélidos rayados del pepinillo, Gusanos de regimiento del otoño, Gusanos de regimiento del Sur. Aplique de 3/4 a 1 pinta por acre.

Moscas del vinagre (Drosophila spp.) Aplique de 1/2 a 1 1/2 pintas por acre. Usualmente se requieren aplicaciones semanales. No lo aplique dentro de 1 día antes de la cosecha.

Insectos de Cultivos de Campo y Forrajes

El Diazinon AG500 siempre debe aplicarse como aspersión en suficiente agua para asegurar que el follaje o el suelo que den totalmente cubiertos, dependiendo del tipo de aplicación.

Caña de Azúcar

Áfidos o Pulgones: Aplique de 1/2 a 1 pinta de Diazinon AG500 por acre. Deje pasar un día después de la aplicación para cosechar. El bagazo y el follaje pueden darse como alimento al ganado.

Tijerillas (Larvas de Elateridos): Aplique en una franja de 12 pulgadas de ancho al centro del surco, 1 galón por acre en suficiente cantidad de agua para cubrir el acre. Haga la aplicación directamente a los trozos de caña en el surco abierto inmediatamente antes de cubrirlos.

Céspedes. Como Bermuda, Zoysia, Pocopota, Ciempés, San Agustín

Chinche de los Pastos - 2-3 oz. fl. o 3-6 oz. fl. en 25 galones de agua para cubrir 1000 pies cuadrados.

Hormigas y Grillos - 4 oz. fl. en 3 gals. de agua para cubrir 1000 pies cuadrados.

Abujes, Pulgas, Garrapatas - 1 1/4 oz. fl. en 3 gals. de agua para cubrir 1000 pies cuadrados.

Gorgopios - 8 oz. fl. en 3 gals. de agua para cubrir 1000 pies cuadrados.

Garrapatas de Perro - 1 1/4 oz. fl. en 3 gals. de agua para cubrir 1000 pies cuadrados. No aplique en los animales.

Roció completamente la yerba cerca de la casa y debajo de los platos de arbustos.

AVISO

Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede ser fatal si se ingiere. Puede absorberse a través de la piel. No aspire los vapores de este producto. No permita que le caiga en los ojos, la piel o la ropa. Lávese bien después de usarlo. Evite la contaminación de alimentos y productos alimenticios para animales. Manténgase fuera del alcance de los animales domésticos. No lo use en las humanas, animales caseros o el ganado. No permita que los niños o los animales caseros invadan los terrenos tratados hasta que la yerba se haya secado totalmente.

Precaución sobre los Peces y la Vida Silvestre

Este producto es tóxico a peces, aves y la vida silvestre. Las aves que se alimentan en áreas tratadas pueden morir. Manténgase fuera de los lagos, arroyos y charcos. No debe aplicarse cuando hay la posibilidad de derrame. No se aplique cuando las condiciones del tiempo favorezcan tormentas de arena de área tratada. No contamine el agua empinando botellas o el esparciendo de desperdicios. Aplique este producto tal y como se especifica en el marbete.

Este producto es altamente tóxico a las abejas expuestas a tratamiento directo o a los residuos que quedan en las colmenas. La información sobre la protección de las abejas puede obtenerse por medio de su representante de Extensión Agrícola.

No comiera, usara ni recopante vacíos. Destruyalo bien pintándolo o aplastándolo. Entierrolo o échelo en un lugar seguro.

Punto más alto de ignición - 82°F (280°C) NO LO USE EN UNO DE RRAME O ALMACEN CERCA DE CALOR O FLAMA VIVA.

**INSECTICIDE
INSECTICIDA**

For control of certain insects on fruits, vegetables and field crops.

Para el control de ciertos insectos en frutas, hortalizas y cultivos de campo.

ONE GALLON


Active Ingredients: 86.96%
O,O-diethyl (2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate 48.00
Xylene 38.96
Inert Ingredients 13.04
Total 100.00

Diazinon (R) AG 500 contains 4 lbs. Diazinon per gallon.

Diazinon (R) AG 500 contains 4 lbs. Diazinon per gallon.

Diazinon (R) trademark of Ciba Geigy Corporation.

EPA Reg. No. 30950-2



**DIRECTIONS FOR USE AT
OF SALE AND WARRANT**

IMPORTANT: Read the entire Conditions of Sale and Warranty. Seller makes no warranty, and the use of this product other than as directed is at the Buyer's risk. See General Information.

Diazinon AG500 is an emulsifiable concentrate diluted with water according to the directions on the label. Do not use in barns or dwellings. Directions for Use given on this label should be followed. Water to assure thorough coverage should be repeated as directed.

Vegetable Foliar Insects: Diazinon AG500 should always be diluted with water to assure thorough coverage. Beans (Pole Beans, Snap Beans, Black Bean Aphids, Leaf Miners, Cucumber Beetles, Apply 1/2 to 1 pint per acre. Do not apply within 7 days of harvest. Beans may be fed to livestock 4 days after harvest.

Cruciferous Cabbage and Cauliflower: Apply 1/2 to 1 pint per acre. A 7-day withholding period is required before feeding to livestock.

AVISO: Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto puede ser fatal si se ingiere. Puede absorberse a través de la piel. No aspire los vapores de este producto. No permita que le caiga en los ojos, la piel o la ropa. Lávese bien después de usarlo. Evite la contaminación de alimentos y productos alimenticios para animales. Manténgase fuera del alcance de los animales domésticos. No lo use en las humanas, animales caseros o el ganado. No permita que los niños o los animales caseros invadan los terrenos tratados hasta que la yerba se haya secado totalmente.

Precaución sobre los Peces y la Vida Silvestre: Este producto es tóxico a peces, aves y la vida silvestre. Las aves que se alimentan en áreas tratadas pueden morir. Manténgase fuera de los lagos, arroyos y charcos. No debe aplicarse cuando hay la posibilidad de derrame. No se aplique cuando las condiciones del tiempo favorezcan tormentas de arena de área tratada. No contamine el agua empinando botellas o el esparciendo de desperdicios. Aplique este producto tal y como se especifica en el marbete.

Este producto es altamente tóxico a las abejas expuestas a tratamiento directo o a los residuos que quedan en las colmenas. La información sobre la protección de las abejas puede obtenerse por medio de su representante de Extensión Agrícola.

No comiera, usara ni recopante vacíos. Destruyalo bien pintándolo o aplastándolo. Entierrolo o échelo en un lugar seguro.

Punto más alto de ignición - 82°F (280°C) NO LO USE EN UNO DE RRAME O ALMACEN CERCA DE CALOR O FLAMA VIVA.

DIRECTIONS FOR USE AND CONDITIONS OF SALE AND WARRANTY

IMPORTANT: Read the entire Directions for Use and the Conditions of Sale and Warranty before using this product. Conditions of Sale and Warranty.

Seller makes no warranty, expressed or implied, concerning the use of this product other than indicated on the label. Buyer assumes all risk of use and handling of this material when such use and handling is contrary to label instructions. General Information.

Diazinon AG500 is an emulsifiable solution which, when diluted with water according to the directions below, is intended for the control of insect pests of agricultural crops. Do not use in barns or dwellings. Do not use on livestock. In the Directions for Use given below, unless otherwise noted, Diazinon AG500 should be mixed with sufficient water to assure thorough coverage. Best control is obtained when application is made at first sign of insects. Applications should be repeated as necessary to maintain control.

Directions for Use

Vegetable Foliar Insects

Diazinon AG500 should always be applied as a spray in sufficient water to assure thorough coverage of the foliage. Beans (Pole Beans, Snap Beans, Lima Beans), Black Bean Aphids, Leaf Miners. Apply 1-1 1/2 pts. per acre. Cucumber Beetles. Apply 3/4 pt. in 100 gals. of water per acre. Do not apply within 7 days of bean harvest. Bean forage or bean hay may be fed to dairy and beef cattle and sheep. Wait 4 days following treatment if forage is to be cut for hay.

Broccoli, Cabbage and Cauliflower: Aphids, Diamondback Moths, Imported cabbageworms (Pieris fasciata) Apply 1-1 1/2 pts. per acre. Applications at 7-10 day intervals will usually be required. Do not apply to broccoli or cauliflower within 5 days of to cabbage within 7 days of harvest.

Carrots

Aphids. Apply 1 pt. per acre. Do not apply within 10 days of harvest.

Cucumbers

Aphids, Serpentine Leaf Miners, Trips. Apply 1 pt. per acre. Do not apply within 7 days of harvest.

Lettuce and Endive

Aphids, Dipterous Leaf Miners. Apply 1-1 1/2 pts. per acre. Do not apply within 10 days of harvest.

Melons and Squash (Cantaloupes, Casaba, Greenhoney, Honeycrisp, Muskmelons, Persian Melons, and Hybrids of these, Watermelons and their hybrids, summer and winter squash).

Aphids, Leafhoppers, Mites. Apply 1-1 1/2 pts. per acre. Serpentine Leaf Miners, Trips. Apply 1-1 1/2 pts. per acre. Do not apply to melons and winter squash within 7 days of harvest.

Radishes, Parsnips and Turnips

Aphids, Leaf Beetles, Dipterous Leaf Miners. Apply 1-1 1/2 pts. per acre. Do not apply within 10 days of harvest. See Melons and Squash above.

Tomatoes

Aphids, Dipterous Leaf Miners: Apply 1 pt. per acre. To control leaf miners, weekly applications are usually required. Banded cucumber Beetles, Fall Armyworms, Southern Armyworms: Apply 3/4-1 pt. per acre. Vinegar Flies (Drosophila spp.): Apply 1/2-1 1/2 pts. per acre. Weekly applications are usually required. Do not apply within 1 day of harvest.

Field and Forage Insects

Diazinon AG500 should always be applied as a spray in sufficient water to assure thorough coverage of the foliage or soil, depending on the type of application.

Sugarcane

Aphids: Apply 1-1 1/2 pt. Diazinon AG500 per acre. Allow 1 day between last application and harvest. Bagasse and forage may be fed to livestock.

Wireworms. Apply, on a 12-inch band centered over the furrow, 1 gal. per acre in sufficient water to obtain thorough coverage. Make application directly to seed pieces in open furrow at covering time.

Lawns: Such as Bermuda, Soysia, Nomow, Centipede, St. Augustine

Lawn Chinch Bugs - 2.3 fl. oz. or 3.6 fl. oz. per 25 gals. water per 1000 sq. ft.

Ants, Crickets - 4 fl. oz. per 3 gals. water per 1000 sq. ft. Chiggers, Fleas, Ticks - 1.1-4 fl. oz. per 3 gals. water per 1000 sq. ft.

Millipedes - 8 fl. oz. per 3 gals. water per 1000 sq. ft.

Brown Dog Ticks - 1.1-4 fl. oz. per 3 gals. water per 1000 sq. ft.

Do not apply to animals. Thoroughly spray the grass next to the house and under shrubbery.

WARNING

Keep out of reach of children.

May be fatal if swallowed. May be absorbed through the skin. Do not breathe spray mist. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Wash thoroughly after handling. Avoid contamination of food and feed. Keep out of reach of domestic animals. Do not use in or near pastures of pet or livestock. Do not permit children or pets to play in sprayed grass until spray has completely dried. First Aid: Wash with water.

This product is toxic to fish, birds, and other wildlife. Birds feeding in treated areas may be killed. Keep out of lakes, streams, or ponds. Do not apply where runoff is likely to occur. Do not apply where weather conditions favor drift from the treated area. Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of wastes. Apply this product only as specified on this label.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on crops. Protective information may be obtained from your Cooperative Agricultural Extension Service.

Do not use empty container. Destroy it by puncturing or crushing. Burn or incinerate in safe place. Minimum Flash Point: 82°F (28°C).

DO NOT USE FOR SPILL OR STORE NEAR HEAT OR OPEN FLAME

INSECTICIDE INSECTICIDA

For control of certain insects on fruits, vegetables and field crops.

Para el control de ciertos insectos en frutas, hortalizas y cultivos de campo.

ONE GALLON

Active Ingredients: 86.96%
O,O-diethyl (2-isopropyl 6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorotioate . 48.00
Xylene 38.96
Inert Ingredients: 13.04
Total 100.00%

Diazinon (R) AG 500 contains 4 lbs. Diazinon per gallon.

Diazinon (R) AG 500 contiene 4 libras de Diazinon por galon.

Diazinon (R) trademark of Ciba-Geigy Corporation.

WARNING:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. See additional warnings on side panels.

AVISO:

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. Vea otros avisos a los lados de la lata.

EPA Reg. No. 30950-2

