



UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
WASHINGTON, D.C. 20460

OFFICE OF
PREVENTION, PESTICIDES AND
TOXIC SUBSTANCES

Ms. Lynne C. Zahigian Agent
for Lawn and Garden Products, Inc.
c/o Lynne Zahigian Regulatory Consulting
P.O. Box 1566
Fallon, NV 89407

MAY 30 2008

SUBJECT: Application for Pesticide Notification (PRN 98-10)
Request General Label Change(s)
EPA Reg. No. 54705-5
Application Dated May 6, 2008

Dear: Registrant:

The Agency is in receipt of your Application for Pesticide Notification under Pesticide Registration Notice (PRN) 98-10 dated 05/06/08 for the above product. The Registration Division (RD) has conducted a review of this request for its applicability under PRN 98-10 and finds that the action(s) requested fall within the scope of PRN 98-10. The label submitted with the application has been stamped "Notification" and will be placed in our records.

Please note that the Agency has issued a Pesticide Registration Notice (PR) 2007-4: Labeling Revisions Required by the Final Rule "Pesticide Management and Disposal; Standards for Pesticide Containers and Containment Statements." All labeling must be updated by August 17, 2009.

If you have any questions, please call me directly at 703-305-6249 or Owen F. Beeder of my staff at 703-308-8899.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Linda Arrington".

Linda Arrington
Notifications & Minor Formulations Team Leader
Registration Division (7505P)
Office of Pesticide Programs

Lynne
LZ **Zahigian**
Regulatory Consulting

May 6, 2008

Document Processing Desk (NOTIF)
Office of Pesticide Programs (7504P)
U.S. Environmental Protection Agency
1200 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, DC 20460

ATTENTION: Ms. Joanne I. Miller, Product Manager (23)
Herbicide Branch

RE: WEED STOPPER / WEED IMPEDE®
EPA Reg. No. 54705-5

In response to your letter dated April 11, 2008, regarding the error in the maximum annual rate for Nonplanted Areas, we am submitting a revised market label for Weed Impede. Please note that Lawn and Garden Products, Inc. is not marketing under the Weed Stopper (Primary Brand Name) at this time only Weed Impede® (Alternate Brand Name). We have also made two additional minor revisions to the label that are covered under the Notification guidelines. The changes are:

1. Under Nonplanted Areas, we corrected the rate for the longer control time for 8 to 12 Months from "12" to "9" fl.oz/1,000 sq. ft.
2. In the Storage and Disposal box under Container Disposal we removed the words "or 1-800-CLEANUP".
3. Lastly, in the Conditions of Sale and Warranty, second paragraph, fifth line, we added the phrase "To the extent consistent with applicable law, buyer..." to the sentence "Buyer and user acknowledge and assume all risks and liability..."

Enclosed in support of this Notification are:

- o A completed Application for Pesticide, EPA Form 8570-1.
- o A copy of the April 11, 2008 letter requesting the revision.
- o Five (5) copies of the label (one copy has been highlighted to show the revisions).

Please note that we have this revised label for Weed Impede (ABN) scheduled to print within the month.


If you have any questions regarding this submission, please contact me at (775) 423-9122.

Regards,

Lynne C. Zahigian

Lynne C. Zahigian
Agent for Lawn and Garden Products, Inc.

cc: LGPI-EPA/Weed Stopper/Weed Impede
LCZ-Chron





United States
Environmental Protection Agency
Washington, DC 20460

Registration
 Amendment
 Other

OPP Identifier Number

Application for Pesticide - Section I

Company/Product Number 54705-5	2. EPA Product Manager Joanne II Miller	3. Proposed Classification <input checked="" type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> Restricted
Company/Product (Name) NEED STOPPER / WEED IMPEDE	PM# 23	
Name and Address of Applicant (Include ZIP Code) Lawn and Garden Products, Inc. c/o Lynne Zahigian Regulatory Consulting P.O. Box 1566 Fallon, NV 89407-1566 <input type="checkbox"/> Check if this is a new address	6. Expedited Review. In accordance with FIFRA Section 3(c)(3)(b)(i), my product is similar or identical in composition and labeling to: EPA Reg. No. _____ Product Name _____	

Section - II

<input type="checkbox"/> Amendment - Explain below.	<input checked="" type="checkbox"/> Final printed labels in response to Agency letter dated <u>04/11/08</u>
<input type="checkbox"/> Resubmission in response to Agency letter dated _____	<input type="checkbox"/> "Me Too" Application.
<input checked="" type="checkbox"/> Notification - Explain below.	<input type="checkbox"/> Other - Explain below.

Explanation: Use additional page(s) if necessary. (For section I and Section II.)

This Notification is in response to the Agency's letter dated April 11, 2008. There are two other minor revisions being made which are explained on my cover letter.

This notification is consistent with the provisions of PR Notice 98-10 and EPA regulations at 40 CFR 152.46, and no other changes have been made to the labeling or the confidential statement of formula of this product. I understand that it is a violation of 18 U.S.C. Sec. 1001 to willfully make any false statement to EPA. I further understand that if this notification is not consistent with the terms of PR Notice 98-10 and 40 CFR 152.46, this product may be in violation of FIFRA and I maybe subject to enforcement action and penalties under sections 12 and 14 of FIFRA.

Section - III

1. Material This Product Will Be Packaged In:

Child-Resistant Packaging <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Unit Packaging <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Water Soluble Packaging <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	2. Type of Container <input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plastic <input type="checkbox"/> Glass <input type="checkbox"/> Paper <input type="checkbox"/> Other (Specify) _____
* Certification must be submitted		If "Yes" Unit Packaging wgt. No. per container	If "Yes" Package wgt No. per container

3. Location of Net Contents Information
 Label Container

4. Size(s) Retail Container

5. Location of Label Directions

6. Manner in Which Label is Affixed to Product
 Lithograph
 Paper glued
 Stenciled Other _____

Section - IV

1. Contact Point (Complete items directly below for identification of individual to be contacted, if necessary, to process this application.)

Name Lynne C. Zahigian	Title Agent	Telephone No. (Include Area Code) (775) 423-9122
---------------------------	----------------	---

Certification
I certify that the statements I have made on this form and all attachments thereto are true, accurate and complete. I acknowledge that any knowingly false or misleading statement may be punishable by fine or imprisonment or both under applicable law.

2. Signature <i>Lynne C. Zahigian</i>	3. Title Agent	6. Date Application Received (Stamped)
4. Typed Name Lynne C. Zahigian	5. Date 5/6/08	

Preemergence Herbicide
Herbida de Preemergencia

WEED IMPEDE

Control Annual Grasses and Many Broadleaf Weeds In:

- Landscape Ornamentals & Bulbs
- Rock Gardens
- Ornamental Bedding Plants
- Ground Covers • Nonplanted Areas




FOR HOMEOWNER USE/ SOLAMENTE PARA USO HOGAR

Active Ingredient:

Oryzalin: 3,5-dinitro-N ⁴ ,N ⁴ -dipropyl-sulfanilamide	40.4%
Other Ingredients:	59.6%
Total:	100.0%

Contains 1.0 pound of active ingredient per quart



Kills Weeds Before They Emerge

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CAUTION/PRECAUCIÓN

(See Attached Booklet for Precautionary Statements and Directions For Use In English & Spanish)

NET CONTENTS:
1 QUART / 946 mL

0996/0408(06)



5/36

WEED IMPEDE®



May Be Tank Mixed With
ROUNDUP® or REMUDA® FULL STRENGTH
For Pre- and Postemergence Control

*Puede Mezclarse en Tanque con
ROUNDUP® o REMUDA® FULL STRENGTH
para Control de Pre- y Postemergencia*

Controle los Pastos Anuales y Muchas Malezas de Hoja Ancha:

- *Plantas Ornamentales de Paisaje y Bulbos*
- *Jardines de Rocas*
- *Plantas Ornamentales de Temporada*
- *Cubiertas de Suelo*
- *Áreas no Sembradas*

Mata a las Hierbas Antes de que Emergen

EPA Reg. No. 54705-5

EPA Est. No. 48498-CA-1

Manufactured for / Fabricado por:

LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.

P.O. Box 35000 • Fresno, CA 93745
(559) 499-2100 • www.montereylawngarden.com

Weed Impede® and Remuda® are registered trademarks of Lawn and Garden Products, Inc.



NET CONTENTS: 1 QUART / 946 mL

0403/0408(06)

6/36

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

FIRST AID

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

HOT LINE NUMBER

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact the National Pesticide Information Center at 1-800-858-7378 for emergency medical treatment information.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Causes eye irritation. Prolonged or frequently repeated contact may cause allergic reactions in some individuals. Avoid contact with eyes or clothing. Applicators should wear long-sleeved shirt and long pants, chemical-resistant gloves and shoes plus socks. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Keep all persons, children and pets out of treated area until sprays have dried.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is toxic to fish. Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

READ ENTIRE LABEL BEFORE EACH USE.

Not for use on plants being grown for sale or other commercial use, or for commercial seed production, or for research purposes. For use on plants intended for aesthetic purposes or climatic modification and being grown in landscapes, ornamental gardens or on lawns.

7/36

GENERAL INFORMATION

WEED IMPEDE® herbicide is a preemergence surface-applied product for the control of many annual grasses and broadleaf weeds in ornamental plantings, rock gardens, ornamental bedding plants, bulbs, ground covers/perennials and established warm-season turfgrass.

WEED IMPEDE® is orange in color and may cause temporary discoloration of sprayed surfaces. If this discoloration is undesirable, it may be altered by using a commercially available colorant such as Blazon® or removed by spraying surface with water or washing with an industrial cleaner immediately after application. WEED IMPEDE® may also be applied with mulch colorants, such as Mulch Magic or Nu-Mulch.

Treatment of Plant Species Not Listed on the Label for WEED IMPEDE®:

Users who wish to use WEED IMPEDE® on plant species not recommended on this label may determine the suitability for use by treating a small number of such plants at a recommended rate. Prior to treatment of larger areas, the treated plants should be observed for any sign of herbicidal injury during 30 to 60 days of normal growing conditions to determine if the treatment is non-injurious to the target plant species. The user assumes responsibility for any plant damage or other liability resulting from use of WEED IMPEDE® on plant species not recommended on this label.

APPLICATION INSTRUCTIONS

SOIL PREPARATION

WEED IMPEDE® controls weeds growing from seed. WEED IMPEDE® will not control emerged weeds. WEED IMPEDE® does not control established weeds, weeds growing from stolons, rhizomes, or root pieces. Therefore, areas to be treated should be free of emerged weeds. Weed residues, pruning and trash should be thoroughly mixed into the soil or removed prior to treatment.

Handheld or Backpack Sprayer Application

The amount of water used to apply WEED IMPEDE® herbicide is not critical, but should be sufficient for uniform coverage of the target area. Calibrate by determining the volume of water required to treat 1,000 square feet. Use this calibration volume to determine the amount of water and WEED IMPEDE® herbicide needed to treat the target area (see the following calibration example). Note: Sprayer calibration (volume of spray needed to treat 1,000 square feet) will vary with each individual operator.

8/36

Steps in Calibration:

1. Mark an area of 1,000 square feet (i.e., 20 by 50 feet or 25 by 40 feet).
2. Place the sprayer on a level surface and add water noting the final level of water in the spray tank.
3. Spray the marked area with a sufficient volume of water to provide uniform coverage. Refill the sprayer to the same level as before measuring the amount of water added. The measured water added to the sprayer is the volume needed to cover 1,000 square feet.
4. Determine the application rate (fl. oz./1,000 sq. ft.) for WEED IMPEDE® from the Recommendations section of this label.
5. To each volume of water used as measured in step 3, add the amount of WEED IMPEDE® as determined in step 4.

Example: If the sprayer uses 2 gallons of water to cover 1,000 square feet and the desired application rate of WEED IMPEDE® is 3 fl. oz./1,000 square feet, then you would add 3 fluid ounces of WEED IMPEDE® to every 2 gallons of water to be used.

USE PRECAUTIONS:

- Avoid spray drift to non-target areas when applying WEED IMPEDE®. Spray drift may result in reduced emergence of non-target plants adjacent to the treated area. Poor weed control may result if directions are not followed. Overapplication may result in plant injury.
- Do not apply to plants that bear edible fruits, flowers, forage, roots or seeds. Do not graze or feed foliage or hay from treated turf or non-planted areas, as illegal residues may occur in plants grown in treated soil.

MIXING DIRECTIONS

SHAKE WELL BEFORE USING.

Make sure spray tank is clean and use only clean water. Fill spray tank 1/2 to 3/4 full. Start agitation and add the required amount of WEED IMPEDE®. Continue agitation and finish filling the spray tank. Maintain continuous agitation until application is completed.

EQUIPMENT CLEANING

If a buildup of material occurs on the walls of the spray tank, it should be removed between fillings by washing with soap and water and rinsing thoroughly. Tanks, lines, screens and nozzles should be cleaned thoroughly after each use.

ACTIVATION AND CULTIVATION

WEED IMPEDE® will remain stable on the soil surface up to 21 days following application. In the absence of timely rainfall, irrigation can be used to activate

9/36

WEED IMPEDE®. A minimum of one-half (1/2) inch of rain or its equivalent in sprinkler irrigation is necessary to activate WEED IMPEDE®. If weeds begin to emerge due to lack of rainfall or irrigation, shallow cultivate 1 to 2 inches deep to destroy existing weeds or remove them by hand. Shallow cultivation to a depth of 1 to 2 inches will enhance herbicidal effectiveness. If WEED IMPEDE® is not activated by rainfall, irrigation or cultivation within 21 days of application or existing weeds have not been removed, erratic weed control may result.

WEEDS CONTROLLED BY WEED IMPEDE®

Annual Grasses:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Barley, little | Lovegrass, Mexican |
| Barnyardgrass (Watergrass) | Lovegrass, Orcutt |
| Bluegrass, annual | Oat, wild |
| Crabgrass, large | Panicum, browntop |
| Crabgrass, smooth | Panicum, fall |
| Crowfootgrass | (Spreading panicgrass) |
| Cupgrass, southwestern | Panicum, Texas |
| Foxtail, bristlegass | (Buffalograss, |
| Foxtail, giant | Coloradograss) |
| Foxtail, green (Pigeongrass) | Ryegrass, Italian |
| Foxtail, robust | Sandbur, field |
| Foxtail, yellow | Signalgrass (<i>Brachiaria</i>) |
| Goosegrass (Silver crabgrass) | Sprangletop, red |
| Johnsongrass (Seedling only) | Witchgrass |
| Junglerice | |

Broadleaf Weeds:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Bittercress | Puncturevine |
| Carpet weed | Purslane, common |
| Chickweed, common | Pusley, Florida |
| Fiddleneck, coast | (Florida purslane, |
| Filaree | Mexican clover, pusley) |
| Groundsel, common | Rocket, London |
| Henbit | Rockpurslane, desert |
| Knotweed, prostrate | Shepherdspurse |
| Lambsquarters | Spurge, prostrate |
| Pigweed | Woodsorrel, yellow (oxalis) |

WEEDS SUPPRESSED BY WEED IMPEDE®

Control of the following weeds may be erratic, ranging from poor to excellent, depending upon soil temperature, time of germination, depth of seed in the soil, and amount and timing of soil moisture:

10/
36

- | | |
|--------------------|------------------------|
| Horseweed | Nightshade, black |
| Ladysthumb | Ragweed, common |
| Lettuce, prickly | Smartweed |
| Mallow, common | Sowthistle, annual |
| Milkweed, climbing | Spurge, spotted |
| Morningglory | Teaweed (Prickly sida) |
| Mustard, black | Velvetleaf |
| Mustard, wild | Wheat, volunteer |

RECOMMENDATIONS

ORNAMENTAL PLANTINGS

WEED IMPEDE® is recommended for use on certain established landscape ornamental plants, including trees, shrubs, ground covers/perennials, and flowers, non-bearing fruit and nut trees, non-bearing vineyards; and ornamental bulbs (See "Ornamental Bulbs" section for special use directions), grown in flowerbeds, ornamental plantings and rock gardens.

Broadcast Application Rates

Length of Control	WEED IMPEDE® Fl. Oz./ 1,000 Sq. Ft.	Minimum Time Between Applications	Total WEED IMPEDE® Allowed Per Year (Fl. Oz./ 1,000 Sq. Ft.)
2 to 4 Months	1.5	2 Months	6
4 to 8 Months	3	4 Months	9

SPECIAL USE PRECAUTIONS

Apply only to established plants that have been transplanted into their growing location for a sufficient period of time to allow the soil to be firmly settled around the roots from packing and rainfall or irrigation.

- To avoid possible injury, do not apply WEED IMPEDE® to:
- Ground covers until they are established and well rooted.
 - Ornamental plantings where there is likelihood of runoff onto lawn areas.
 - Areas containing dichondra or cool season turfgrass species.

Applications of WEED IMPEDE® over the top of plants with newly forming buds may cause injury. In this situation a directed spray is recommended or irrigate immediately after application to wash WEED IMPEDE® into the soil.

For soils treated with WEED IMPEDE® during the previous season, plant only the ornamental species listed on this label or injury may occur.

11/36

Iceplant: When establishing unrooted ice plant on coarse textured soils in landscape planting, do not exceed the 1.5 fl. oz. per 1,000 sq. ft. of WEED IMPEDE® or plant injury may occur.

Note: Injury on the following plant species has been observed following applications of WEED IMPEDE® and use is not recommended.

- Arborvitae, techny (*Thuja occidentalis* 'Techny')
- Begonia (*Begonia* spp.)
- Coleus (*Coleus hybridus*)
- Deutzia, slender (*Deutzia gracilis*)
- Douglas Fir (*Pseudotsuga menziesii*)
- Eastern Hemlock (*Tsuga canadensis*)

TANK MIX COMBINATIONS

Tank mix combinations of WEED IMPEDE® plus ROUNDUP® or REMUDA® FULL STRENGTH may be used to control undesirable vegetation in ornamental areas. WEED IMPEDE® may also be tank mixed with Gallery® herbicide and applied preemergence to broaden the spectrum of broadleaf weed control in ornamental areas. Applied as directed, these tank mixes of WEED IMPEDE® will provide control of susceptible weed species listed on the respective labels. Refer to tank mix product labels for specific use directions, precautions and limitations before use.

WEED IMPEDE® Plus ROUNDUP® or REMUDA® FULL STRENGTH: Tank mix combinations of WEED IMPEDE® plus ROUNDUP® or REMUDA® FULL STRENGTH are recommended to control existing undesirable vegetation. Applied as directed, WEED IMPEDE® plus ROUNDUP® or REMUDA® FULL STRENGTH will provide postemergence control of susceptible weed species listed on the label for ROUNDUP® or REMUDA® FULL STRENGTH and residual preemergence control of susceptible weed species listed on the label for WEED IMPEDE®. Refer to the label for ROUNDUP® or REMUDA® FULL STRENGTH for specific use directions, precautions and limitations before use.

Precautions: Do not apply sprays containing ROUNDUP® or REMUDA® FULL STRENGTH over the top of ornamental plants. Extreme care must be exercised to prevent sprays containing ROUNDUP® or REMUDA® FULL STRENGTH from coming in contact with foliage and stems of turfgrasses, trees, shrubs, or other desirable vegetation since severe damage or death may result. If spraying with ROUNDUP® or REMUDA® FULL STRENGTH in areas adjacent to desirable plants, use a shield to prevent spray from contacting foliage and stems of desirable plants.

WEED IMPEDE® may be used on the following established plant species:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Abelia, Glossy | *Arborvitae |
| Acacia | Ash |
| Agave | Aster |
| Almond (non-bearing) | Avocado (non-bearing) |
| Andromeda | Azalea |
| Apple (non-bearing) | Baby's Breath |
| Apricot (non-bearing) | Barberry |

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Bellflower | Elm |
| Birch | Escallonia |
| Bird of Paradise | Eucalyptus |
| Blazing Star | Euonymus |
| Bleeding Heart | False Spirea |
| Bottlebrush | Falsecypress |
| Bougainvillea | Fatsyhedera |
| Boxwood | Ficus |
| Bridal Wreath | Fig (non-bearing) |
| Broom | Filbert (non-bearing) |
| Brush Cherry | Fir |
| Caladium | Forsythia |
| California Laurel | Gardenia |
| Caneberries (non-bearing) | Gazania |
| Cape Weed | Geranium |
| Carob | Geum |
| Carpet Bugle | Ginkgo |
| Carrot wood | Gladiolus |
| Cassia | Goldenrain tree |
| Century Plant | Gooseberry (non-bearing) |
| Cherry (non-bearing) | Grape (non-bearing) |
| Chrysanthemum | Heavenly Bamboo (Nandina) |
| Cinquefoil | Hibiscus |
| Citrus (non-bearing) | Holly |
| Citrus, Ornamental | Honey Locust |
| Cleyera, Japanese | Honeysuckle |
| Coneflower | Hopsedebush |
| Coreopsis | Hosta |
| Cotoneaster | Ice Plant |
| Cottonwood | Impatiens |
| Coyotebush | Iris |
| Crabapple | Ivy |
| Crape Myrtle | Japanese Spurge |
| Cryptomeria, Japanese | Jerseytea |
| Currant (non-bearing) | Juniper |
| Cypress | Kiwi (non-bearing) |
| Daisy | Laurelcherry |
| Daylily | Leucothoe |
| *Deutzia | Lilac |
| Dewberry (non-bearing) | Lily Turf |
| Dogwood | Lily-of-the-Nile |
| Eastercactus | Lily-of-the-Valley |
| Elderberry (non-bearing) | Linden |

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| Macadamia Nut (non-bearing) | Prune (non-bearing) |
| Magnolia | Pyracantha (Firethorn) |
| Mahogany | Ramanas Rosa |
| Manzanita | Ranunculus |
| Maple | Raphiolepus |
| Marigold | Red Cedar |
| Mockorange | Redbud |
| Mondo Grass | Redwood |
| Moss Rose | Rhododendron |
| Mountain Laurel | Rose |
| Mulberry | Rose of Sharon |
| Myoporum | Rosemary |
| Myrtle | Sage |
| Nectarine (non-bearing) | Sequoia |
| Oak | Shrimp Plant |
| Oleander | Snadragon |
| Olive (non-bearing) | Spruce |
| Oregon Grape | Star Jasmine |
| Osmanthus | Stonecrop |
| Palm | Sumac |
| Palo Verde | Sweet William |
| Pampas Grass | Sweetgum |
| Pansy | Sycamore |
| Peach (non-bearing) | Toyon |
| Pear (non-bearing) | Trumpet Vine |
| Pecan (non-bearing) | Viburnum |
| Pepper Tree | Walnut (non-bearing) |
| Periwinkle | Weigela |
| Petunia | Wild Lilac |
| Photinia | Willow |
| Pine | Wintercreeper |
| Pistachio (non-bearing) | Woodwaxen |
| Pittosporum | Xylosma |
| Plum (non-bearing) | Yarrow |
| Plumbago | Yellow Tab |
| Podocarpus | Yew |
| Pomegranate (non-bearing) | Yewpine |
| Privet | Yucca |
| Protea | Zinnia |

*See list of plant species under "Special Use Precautions" for which use is not recommended.

Note: Non-bearing plants are defined as those which will not bear fruit for at least one year after treatment.

14/
136

ORNAMENTAL BULBS

WEED IMPEDE® may be applied for control of susceptible annual weeds in ornamental bulbs, e.g., bulbous iris, daffodil (narcissus), hyacinth and tulip. Apply WEED IMPEDE® to the soil surface 2 to 4 weeks after planting, but prior to the emergence of annual weeds. For fall planted bulbs, apply WEED IMPEDE® again in late winter or early spring to weed-free soil surfaces.

Broadcast Application Rates

Time of Application	Soil Texture	WEED IMPEDE® Fl. Oz./ 1,000 Sq. Ft.	Minimum Time Between Applications	Total WEED IMPEDE® Allowed Per Year (Fl. Oz./1,000 Sq. Ft.)
Fall	Coarse	0.5	3 Months	1
Fall	Medium and Fine	1.0	3 Months	2
Feb - Mar	All Soil Textures	0.5	3 Months	2

SPECIAL USE PRECAUTIONS

- DO NOT apply to tulip plants that have emerged to a height greater than 3/4 inch.
- DO NOT apply to gladioli corms prior to emergence or less than one inch in diameter.

WARM SEASON TURFGRASSES

WEED IMPEDE® may be applied as a preemergence treatment for control of annual grasses and certain broadleaf weeds in established warm season turf including bahiagrass, bermudagrass, buffalograss, centipedegrass, St. Augustinegrass, zoysiagrass and established tall fescue growing in warm season areas. Established turf is defined as a dense turf having a well-anchored root system and healthy, vigorous top growth. Use WEED IMPEDE® only as a part of a total turf management program that includes good fertilization practices.

Any cultural practices that disturb the soil, such as aerification or verticutting, should be done prior to application of WEED IMPEDE®.

WEED IMPEDE® will not control emerged weeds. Successful preemergence control of weeds listed on this label requires that WEED IMPEDE® be applied prior to weed germination and be activated by at least one-half (1/2) inch of rainfall or irrigation within 21 days of application.

WEED IMPEDE® may injure turf that is not well-established or is stressed or weakened due to unfavorable winter climatic conditions, drought, nematodes, or other factors which damage or weaken turf root systems. Apply WEED IMPEDE® only to healthy, well-established turf that has a well-anchored root system.

DO NOT apply WEED IMPEDE® in the spring or early summer to tall fescue turfgrass reseeded the previous fall. DO NOT use on other fescue species.

In bermudagrass areas that have been reseeded with winter grasses, a spring application of WEED IMPEDE® will thin the overseeded grasses.

Annual Grasses Controlled by WEED IMPEDE®

Summer Annuals:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Barnyardgrass (Watergrass) | Foxtail, robust |
| Crabgrass, large | Foxtail, yellow |
| Crabgrass, smooth | Goosegrass (silver crabgrass) |
| Crowfootgrass | Johnsongrass (seedling only) |
| Foxtail, bristlegass | Ryegrass, Italian |
| Foxtail, giant | Sandbur, field |
| Foxtail, green (pigeongrass) | |

Winter Annuals:

- Bluegrass, Annual

Annual Broadleaf Weeds Controlled by WEED IMPEDE®

Summer Annuals:

- | | |
|---------------------|------------------|
| Carpetweed | Purslane, Common |
| Knotweed, Prostrate | |

Winter Annuals:

- | | |
|-------------------|--------|
| Chickweed, Common | Henbit |
|-------------------|--------|

Broadleaf Weeds Suppressed by WEED IMPEDE®

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| Groundsel, Common | Woodsorrel, Yellow (Oxalis) |
| Spurge, Prostrate | |

APPLICATION RATES, FREQUENCY AND TIMING OF APPLICATION

WEED IMPEDE® can be applied in the spring for summer annual grass and broadleaf weed control, and in the fall for annual bluegrass and winter annual broadleaf weed control.

Broadcast Application Rates

Use Area	WEED IMPEDE® Fl. Oz./ 1,000 Sq. Ft.	Minimum Time Between Applications	Total WEED IMPEDE® Allowed Per Year (Fl. Oz./ 1,000 Sq. Ft.)
All, except Florida	1-1.5	3 Months	4
Florida	1	3 Months	3

APPLICATION EQUIPMENT

Apply WEED IMPEDE® evenly over the turfgrass area. Avoid spray pattern skips and overlaps that may result in incomplete coverage or over-application. For best results use application equipment designed to uniformly broadcast liquid herbicides. Check equipment frequently to make sure it is working properly and distributing spray uniformly.

RESEEDING

Herbicides that control annual weeds may also affect establishment of desirable turfgrass seedlings. Reseeding should be delayed for at least 90-120 days following application of WEED IMPEDE®. With reseeding, it is essential that proper cultural practices such as soil cultivation and seedbed preparation, irrigation and fertilization be followed. For satisfactory reseeding results following use of WEED IMPEDE®, the seeding rate should be increased and equipment designed to place seed in full contact with soil (such as the Rogers Aero Seeder) should be employed.

SPECIAL USE PRECAUTIONS

To avoid possible injury, DO NOT apply WEED IMPEDE® to:

- Cool season turfgrass species (bluegrass, fescues, bentgrasses, etc.).
- Newly sprigged or sodded areas of bermudagrass, St. Augustinegrass, centipedegrass, or zoysiagrass until these turfgrasses are well-established and have well-anchored root systems.
- Newly hydromulched areas of bermudagrass until such areas are well-established.
- Bermudagrass variety "Sun Turf" when WEED IMPEDE® is tank mixed with atrazine.

17/
36

NONPLANTED AREAS

Tank mix combinations of WEED IMPEDE® plus REMUDA® FULL STRENGTH or ROUNDUP® may be used to control undesirable vegetation in nonplanted areas such as roadsides, rights-of-ways, etc. When applied according to use directions, these tank mixes will provide control of susceptible weed species listed on the respective product labels. Refer to tank mix product labels for specific use directions, precautions, and limitations before use.

Broadcast Application Rates

Length of Control	WEED IMPEDE® Fl. Oz./ 1,000 Sq. Ft.	Minimum Time Between Applications	Total WEED IMPEDE® Allowed Per Year (Fl. Oz./1,000 Sq. Ft.)
2 to 4 Months	1.5	2 Months	6
8 to 12 Months	4.5	8 Months	9

STORAGE AND DISPOSAL

DO NOT CONTAMINATE WATER, FOOD OR FEED BY STORAGE OR DISPOSAL.

STORAGE: To be stored in original container in a cool, well-ventilated area inaccessible to children and pets. Store above 40°F.

CONTAINER DISPOSAL: If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

18/
36

CONDITIONS OF SALE AND WARRANTY

Lawn and Garden Products, Inc. warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purposes stated when used in accordance with the use directions under normal conditions. Lawn and Garden Products, Inc. neither makes nor authorizes any agent or representative to make, any other warranties, express or implied, including fitness or merchantability.

The directions for use of this product are believed to be reliable and should be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks inherently associated with use of this product. Plant injury, ineffectiveness or other unintended consequences may result because of such factors as timing and method of application, weather and plant conditions, presence of other materials, or other influencing factors, all of which are beyond the control of Lawn and Garden Products, Inc. and Seller. To the extent consistent with applicable law, buyer and user acknowledge and assume all risks and liability resulting from the handling, storage and use of the material not in strict accordance with directions given herewith. In no case shall Lawn and Garden Products, Inc. or the Seller be liable for consequential, special, indirect, or incidental damages or losses resulting from the handling or use of this product. The foregoing is a condition of sale by Lawn and Garden Products, Inc. and is accepted as such by the Buyer.

(Blazon® - Milliken Chemical)
(Roundup® - Monsanto)
(Gallery® - Dow AgroSciences LLC)

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN**

PRIMEROS AUXILIOS

SI LE CAE EN LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y lávelo despacio y con cuidado con agua durante 15 a 20 minutos. Qúitese los lentes de contacto, si los usa, después de los primeros 5 minutos, luego siga lavándose los ojos. Llame a un centro de envenenamientos o al médico para obtener consejos de tratamiento.

NÚMERO DE LÍNEA DIRECTA

Tenga a mano el recipiente o etiqueta del producto al llamar al centro de envenenamientos o al médico o al solicitar tratamiento. Puede también llamar al Centro de Nacional de Información sobre Pesticidas, al 1-800-858-7378 para obtener información sobre tratamiento médico de emergencia.

ADVERTENCIAS

Riesgos para los Seres Humanos y los Animales Domésticos

PRECAUCIÓN: Causa irritación de los ojos. El contacto prolongado o repetido frecuentemente puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Las personas que lo aplican deben vestir camisa de manga larga y pantalones largos, guantes resistentes a las substancias químicas, zapatos y calcetines. Lave a fondo con jabón y agua después de manejar el producto y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco. Qúitese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Mantenga a todas las personas, niños y mascotas fuera del área tratada hasta que el rociado se haya secado.

RIESGOS AMBIENTALES

Este pesticida es tóxico para los peces. No lo aplique directamente al agua. No contamine el agua cuando se deshaga del agua o enjuague proveniente del lavado de los equipos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

El uso de este producto de manera inconsistente con las instrucciones de su etiqueta viola la ley federal.

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE CADA USO.

20
/36

No debe usarse en plantas que se cultivan para la venta u otros usos comerciales, ni para la producción comercial de semillas, ni para fines de investigación. Para usarlo en plantas cultivadas con fines estéticos, modificación climática y que se cultivan en paisajismo con plantas, jardines ornamentales o en el césped.

INFORMACIÓN GENERAL

El herbicida WEED IMPEDE® es un producto de preemergencia que se aplica a superficies para el control de muchas hierbas anuales y malezas de hoja ancha en cultivos ornamentales, jardines de rocas, en plantas de temporada ornamentales, en bulbos, cubiertas de suelos y perennes, y hierbas para césped de temporada cálida establecidas.

WEED IMPEDE® es de color anaranjado y puede causar la decoloración temporal de las superficies rociadas. Si esta decoloración no es deseable, puede ser alterada usando un colorante comercial como es el Blazon® o eliminada rociando la superficie con agua o lavándola con un limpiador industrial inmediatamente después de la aplicación. WEED IMPEDE® puede también aplicarse en colorantes de abono orgánico tales como Mulch Magic o Nu-Mulch.

Tratamiento de especies de plantas que no están indicadas en la etiqueta de WEED IMPEDE®:

Para decidir si WEED IMPEDE® es apropiado para aplicarlo a especies de plantas no recomendadas en esta etiqueta, el usuario podrá tratar un pequeño número de dichas plantas con la dosis recomendada. Antes de aplicar el tratamiento a áreas mayores, se debe observar durante 30 o 60 días de su crecimiento a las plantas tratadas para ver si muestran lesiones por herbicida y así decidir si el tratamiento es inocuo para ellas. El usuario asume la responsabilidad por cualquier daño a las plantas u otras responsabilidades que puedan surgir del uso de WEED IMPEDE® sobre especies de plantas no recomendadas en esta etiqueta.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA TIERRA

WEED IMPEDE® controla las malezas que crecen de semillas. WEED IMPEDE® no controlará las malezas que ya han emergido. WEED IMPEDE® no controla las malezas establecidas, las malezas que crecen de estolones (tallos rastreros), rizomas, o pedazos de raíces. Por lo tanto, las áreas que deban tratarse deberán estar libres de malezas emergidas. Los residuos de malezas, podas y basura deben mezclarse muy bien en la tierra o eliminados antes del tratamiento.

21
/36

Aplicación con el Rociador de Mano o Mochila

La cantidad de agua usada para aplicar el herbicida WEED IMPEDE® no es fundamental, pero debe ser suficiente para una cobertura uniforme del área elegida para la aplicación. Para graduar la cantidad apropiada, determine cuánta agua es necesaria para tratar 1,000 pies cuadrados. Utilice esta graduación de volumen para definir la cantidad de agua y de herbicida WEED IMPEDE® necesarias para tratar el área elegida (consulte el siguiente ejemplo de graduación). Nota: La graduación del rociador (el volumen de rociado necesario para tratar 1,000 pies cuadrados) variará con cada operador individual.

Pasos en la graduación:

1. Delimite un área de 1,000 pies cuadrados (es decir, un área de 20 por 50 pies o de 25 por 40 pies).
2. Ponga el rociador en un sitio nivelado y agregue agua, tome nota del nivel final del agua en el tanque de rociado.
3. Rocíe el área delimitada con un volumen de agua suficiente para cubrirla *uniformemente*. Recargue el rociador hasta el mismo nivel que antes midiendo la cantidad de agua agregada. El agua medida agregada al rociador es el volumen necesario para cubrir 1,000 pies cuadrados.
4. Determine la tasa de aplicación (onzas líquidas/1,000 pies cuadrados) para WEED IMPEDE® de la sección "Recomendaciones" de esta etiqueta.
5. A cada volumen de agua usado como se midió en el paso 3, agregue la cantidad de WEED IMPEDE® determinada en el paso 4.

Por ejemplo: Si el rociador usa 2 galones de agua para cubrir 1,000 pies cuadrados y la aplicación deseada de WEED IMPEDE® es 3 onzas líquidas para 1,000 pies cuadrados, entonces agregaría 3 onzas líquidas de WEED IMPEDE® por cada 2 galones de agua que vaya a usar.

PRECAUCIONES DE USO:

- Al aplicar el WEED IMPEDE® evite que el rocío derive hacia las áreas fuera del objetivo. La deriva del rociado podrá reducir la emergencia de plantas que no se desea controlar en áreas adyacentes al área tratada. En caso de seguir las instrucciones se causará un mal control de las malezas. La aplicación excesiva podrá resultar en daños a las plantas.
- No aplique a las plantas que producen frutos, flores, forraje, raíces o semillas comestibles. No haga pastar animales ni los alimente con follaje o heno de césped o de áreas no plantadas tratadas, puesto que pueden ocurrir residuos ilegales en las plantas que crecen en la tierra tratada.

27/36

INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR

AGITE BIEN ANTES DE USAR.

Cerchiórese que el tanque de rociado esté limpio y sólo use agua limpia. Llène el tanque de rociado hasta 1/2 a 3/4 de su capacidad. Comience la agitación y agregue la cantidad necesaria de WEED IMPEDE®. Continúe la agitación y termine de llenar el tanque de rociado. Mantenga una agitación continua hasta que se complete la aplicación.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Si se acumulan residuos de material en las paredes del tanque de rociado, deben eliminarse entre las recargas lavando con agua y jabón y enjuagando a fondo. Los tanques, las tuberías, los coladores y los picos deben limpiarse completamente después de cada uso.

ACTIVACIÓN Y CULTIVO

WEED IMPEDE® permanecerá estable sobre la superficie del suelo hasta 21 días después de la aplicación. En ausencia de lluvia oportuna, se puede utilizar la irrigación para activar el WEED IMPEDE®. Hace falta un mínimo de una media (1/2) pulgada de lluvia o de su equivalente en irrigación de rociador para activar el WEED IMPEDE®. Si las malezas comienzan a emerger debido a la falta de lluvia o irrigación, labre la tierra a una profundidad de 1 a 2 pulgadas para destruir las hierbas existentes o sáquelas a mano. El labrado de la tierra a una profundidad de 1 a 2 pulgadas realzará la eficacia del herbicida. Si el WEED IMPEDE® no es activado por la lluvia, la irrigación o el labrado de la tierra dentro de un lapso de 21 días de su aplicación o si las malezas no han sido eliminadas, podrá resultar un control errático de las malezas.

MALEZAS CONTROLADAS POR WEED IMPEDE®

Hierbas Anuales:

- Cebada, pequeña
- Capín arroz (*Echinochloa crus-galli*)
- Zácate azul, pasto azul (*Poa annua*)
- Zácate cangrejo velludo (*Digitaria sanguinalis*)
- Digitaria violascens
- Eleusine Indica
- Eriochloa Gracilis
- Limpiabotella (*Setaria faberii*)
- Pasto colorado (*Panicum coloratum* L.),
- Setaria macrocarpa
- Almorejo verde (*Setaria viridis* (L.) P. Beauv.)

Setaria viridis var. Robusta-purpurea
 Cola de zorro (*Setaria glauca*)
 Pata de gallina
 Sorgo de Alepo (plantas jóvenes solamente)
 Pierna de gallo meridional, Pasto colorado
 Pasto llorón (*Eragrostis curvula*)
 Gramilla de huerta (*eragrostis virescens*)
 Avena, salvaje
 Browntop panicum (*sin nombre en español*)
 Pasto colchón (*Panicum dichotomiflorum*)
 Limpiabotella (*Setaria faberii*) Texas
 Ballica, Italiana
 Espolón, cadillo bravo
 Granadilla (*Brachiaria*)
 Paja morada (*leptochloa filiformis*)
 Hierba de la Bruja (*panicum capillare*)

Malezas de Hoja Ancha:
 Mastuerzo menor, mastuerzo amargo
 Clavelina montes (*mollugo verticillata*)
 Pampina (*Stellaria media* (L.) Vill.)
 Amsinckia
 Alfilerillo
 Hierba cana
 Ortiga muerta (*lamium amplexicaule* L.)
 Sanguinaria, cien nudos (*polygonum aviculare*)
 Cenizo, quinoa blanca
 Cenizo, quinoa blanca (Lambsquarters y Pigweed son la misma planta)
 Roseta francesa
 Verdolaga (*Portulaca oleracea*)
 Ipecacuana blanca (*Verdolaga de florida, Mexicana*)
 Richardia Scabra
 Pamita
 Calandrinia ciliata
 Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris*)
 Sanguinaria, cien nudos (*polygonum aviculare*)
 Oxalis priceae

24/136

MALEZAS CONTROLADAS POR WEED IMPEDE®

El control de las siguientes malezas puede ser errático, desde mediocre hasta excelente, según la temperatura de la tierra, tiempo de germinación, profundidad de la semilla en la tierra y cantidad, oportunidad de la humedad de la tierra.

- Conyza canadensis
- Polygonum
- Lechuga borde (*latuca scariola*)
- Malva silvestre (*malva silvestris*)
- Asclepia
- Campanilla (*Ipomoea purpurea*)
- Mostaza negra (*Brassica nigra*)
- Mostaza silvestre (*Synapis arvensis L.*)
- Tomatillo del diablo, morella negra, hierba mora (*solanum nigra*)
- Artemisia (*Ambrosia artemisiifolia*)
- Conejas, collejera (silene - muchas especies)
- Cerraja (*sonchus oleraceus*)
- Afata hembra (*sida spinosa*)
- Malva blanca
- Trigo voluntario (no sembrado, contaminado) (*triticum aestivum*)

RECOMENDACIONES

PLANTACIONES ORNAMENTALES

El WEED IMPEDE® se recomienda para utilizarse en ciertas plantas ornamentales de paisajismo establecidas, incluyendo árboles, arbustos, cubiertas de terreno/perennes y flores, frutales y árboles de nueces que no estén cargados de frutos vana, sin uvas, y bulbos ornamentales (Consulte la sección de "Bulbos ornamentales" para conocer las instrucciones de usos especiales) que crezcan en cuadros de flores, plantas ornamentales y jardines de rocas.

Tasas de Aplicación por Diseminación:

Duración del Control	WEED IMPEDE® Onzas fluidas/ 1,000 pies ²	Tiempo Mínimo Entre Aplicaciones	Total de WEED IMPEDE® Permitido por Año Onzas fluidas/ 1,000 pies ²
2 a 4 Meses	1.5	2 Meses	6
4 a 8 Meses	3	4 Meses	9

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Aplique sólo a plantas establecidas que han sido transplantadas a su ubicación de crecimiento por un lapso suficiente para permitir que la tierra se asiente firmemente alrededor de las raíces por apisonamiento y la lluvia o la irrigación.

Para evitar las posibles lesiones, no le aplique WEED IMPEDE® a:

- Cubiertas de terreno hasta que no estén bien establecidas y enraizadas.
- A plantaciones ornamentales donde haya una posibilidad de escurrimiento a áreas de césped.
- Áreas que contengan oreja de ratón (dichondra) o especies de césped y tapizadoras de tiempo fresco.

Las aplicaciones de WEED IMPEDE® sobre el tope de plantas con botones en formación pueden causar daños. En esta situación se recomienda un rociado dirigido o el regado inmediatamente después de la aplicación para lavar el WEED IMPEDE® al suelo.

Para los suelos tratados con WEED IMPEDE® durante la temporada previa, plante sólo las especies ornamentales indicadas en esta etiqueta o podrá causar daños.

Iceplant (*Conicosia pugioniformis*): Cuando establezca esta planta en tierra de textura gruesa en plantíos paisajistas, no exceda de 1.5 onzas fluidas por 1,000 pies² de WEED IMPEDE® o podrá hacerle daño a la planta.

Nota: Se han observado daños en las siguientes especies de plantas luego de aplicaciones de WEED IMPEDE® y el uso no se recomienda.

- Árbol de la vida (*Thuja occidentalis* 'Techny')
- Begonia (*Begonia spp*)
- Coleus (*Coleus hybridus*)
- Deutzia (*deutzia gracilis*)
- Abeto azul de Douglas (*Pseudotsuga menziesii*)
- Tuya del Canadá (*Tsuga canadensis*)

COMBINACIONES DE MEZCLA DE TANQUE

Se pueden utilizar mezclas de tanque de WEED IMPEDE® más ROUNDUP® o REMUDA® FULL STRENGTH para controlar la vegetación indeseable en las áreas ornamentales. El WEED IMPEDE® puede mezclarse también con el herbicida Gallery® y aplicado antes de la emergencia para ampliar el ámbito de control de malezas de hoja ancha en las áreas ornamentales. Aplicado según las instrucciones, estas mezclas de tanque de WEED IMPEDE® darán el control de las especies susceptibles indicadas en las respectivas etiquetas. Consulte las etiquetas de mezcla de producto en el tanque para instrucciones de usos específicos, precauciones y limitaciones antes de su utilización.

26
36

WEED IMPEDE® Más ROUNDUP® o REMUDA® FULL STRENGTH: Las combinaciones de tanque de WEED IMPEDE® más ROUNDUP® o REMUDA® FULL STRENGTH se recomiendan para controlar la vegetación indeseable existente. Si se aplica según las instrucciones, WEED IMPEDE® más ROUNDUP® o REMUDA® FULL STRENGTH darán control post-emergente a especies de malezas susceptibles listados en la etiqueta de ROUNDUP® o REMUDA® FULL STRENGTH y control residual pre-emergente de malezas susceptibles indicadas en la etiqueta de WEED IMPEDE®. Consulte la etiqueta de ROUNDUP® o REMUDA® FULL STRENGTH para las instrucciones de usos específicos, las precauciones y limitaciones antes de su utilización.

Precauciones: No aplique rocíos que contengan ROUNDUP® o REMUDA® FULL STRENGTH sobre el tope de las plantas ornamentales. Se debe ejercer mucho cuidado para evitar que los rocíos que contengan ROUNDUP® o REMUDA® FULL STRENGTH entren en contacto con el follaje y los tallos de las hierbas de céspedes, árboles, arbustos u otra vegetación deseable puesto que ello causará graves daños o la muerte de las plantas. Si debe rociar con ROUNDUP® o REMUDA® FULL STRENGTH en áreas cercanas a plantas deseables, utilice un escudo para evitar que el rocío caiga sobre el follaje y los tallos de las plantas deseables.

El WEED IMPEDE® puede usarse sobre las siguientes especies de plantas establecidas.

- Abelia (*Abelia grandiflora*)
- Acacia
- Agave
- Aimendro (sin frutos)
- Andromeda
- Manzano (sin frutos)
- Melocotón (sin frutos)
- *Árbol de la vida
- Fresno
- Aster
- Aguacate (sin frutos)
- Azalea
- Fior de ilusión (*Gypsophila elegans*)
- Mahonia repens
- Campanillas de la Virgen (*Campanula rapunculoides* L.)
- Abedul de las canoas
- Ave del Paraíso (*Strelitzia reginae*)
- Liatris (*Liatris spicata*)
- Dicentra uniflora

Callistemo, Limpitubos llorón (*Callistemon viminalis*)
 Bugambilia (*Bougainvillea glabra*)
 Buxus microphylla
 Corona de novia (*Spirea cantoniensis*)
 Retama de escobas (*Cytisus scoparius*)
 Cerezo australiano (*Syzygium paniculatum*)
 Caladium bicolor
 Laurel californiano
 Mora de castilla (*rubus glaucus*) (sin frutos)
 Arctotheca calendula
 Algarrobo, garrofer (*ceratonia siliqua*)
 Ajuga reptans
 Cupaniopsis anacardiopsis
 Cassia occidentalis
 Agave (*agave deserti*)
 Cerezo (sin frutos)
 Crisantemo (*potentilla spp*)
 Cítricos (sin frutos)
 Cítricos, ornamentales
 Sakaki (*Cleyera Japonica*)
 Equinácea (*Echinacea purpurea*)
 Coreopsis lanceolata
 Falso membrillo (*Cotoneaster Franchetii*)
 Álamo, Chopo (*Populus L.*)
 Baccaris pilularis
 Manzana silvestre (*Malus spp.*)
 Crespón, reina de las flores (*agerstroemia indica*)
 Sakaki (*Cleyera Japonica*)
 Grosella (sin frutos)
 Ciprés
 Margarita
 Lirio Japonés (*Hemerocallis L.*)
 *Deutzia
 Rubus hispida (sin frutos)
 Comejo (*comus L.*)
 Plumilla de Santa Teresa (*Hatiora gaortneri*)
 Sauco (*Sambucus L.*) (sin frutos)
 Olmo
 Escallonia (*Escallonia Rubra*)
 Eucalipto
 Evonymus cuneifolia

28/36

- Astilbe
- Abeto de Corea (*Chamaecyparis obtusa*)
- Aralia hiedra (*Fatschedera lizel*)
- Ficus
- Higo (sin frutos)
- Avellana (*coryllus avellana*) (sin frutos)
- Abeto
- Forsythia
- Gardenia
- Gazania
- Geranio
- Geum
- Ginkgo
- Gladiolo
- Jabonero de China, árbol de los farolitos (*Koelreuteria paniculata*)
- Grosella (*Ribes oxycanthoides*) (sin frutos)
- Vitis L. uva (sin frutos)
- Nandina (*Nandina domestica*)
- Hibisco
- Flor de pascua (*Ilex opaca*)
- Acacia negra (*Gleditsia triacanthos inermis*)
- Sáuco rojo (*Sambucus racemosa*)
- Chirca de monte, chapulstie (*dodonaea viscosa*)
- Hermosa de día (*hosta plantaginea*) (*Conicostia puglioniformis*)
- Alegria (*Impatiens walleriana*)
- Lirio amarillo (*iris pseudacorus*)
- Hiedra
- Pachysandra terminalis
- Ceanothus americanus
- Sabina (*Juniperus L.*)
- Kiwi (sin frutos)
- Laurel cerezo (*Prunus caroliniana*)
- Agarista populifolia
- Lilo (*Syringa L.*)
- Liriope (*Liriope muscari*)
- Agapanto (*agapanthus africanus*)
- Lirio del Valle (*convallaria majalis*)
- Tilo (*Tilia vulgaris*)
- Macadamia (*Macadamia F.*) (sin frutos)
- Magnolia
- Caoba

29/
36

Manzanita
Arce (*Acer L.*)
Caléndula (*calendula L.*)
Celindo (*Philadelphus L.*)
Ophiopogon japonicus
Verdolaga (*portulaca grandiflora*)
Kalmia (*Kalmia latifolia*)
Morera (*Morus L.*)
Mioporo (*Myoporum*)
Mirto (*Myrtus communis L.*)
Nectarina (sin frutos)
Roble
Baladre (*Nerium L.*)
Olivo (sin frutos)
Mahonia (*Mahonia aquifolium*)
Olivo oloroso (*Osmanthus fragrans*)
Palma
Palo Verde
Cortaderia selloana
Violeta (*Viola bicolor pursh*)
Durazno (sin frutos)
Pera (sin frutos)
Pacana (sin frutos)
Falso pimentero, lentisco (*Schinus L.*)
Vincapervinca mayor (Vinca major) y Vincapervinca menor
(Vinca minor)
Petunia
Photinia
Pino
Pistacho (sin frutos)
Pitosporo de bayas anaranjadas (*Pittosporum undulatum*)
Ciruelo (*prunus*) (sin frutos)
Jazmin azul (*Plumbago*)
Romerillo (*Podocarpus*)
Gránada (sin frutos)
Aligustre, ligustro, alheña elevada, malmadrillo, capicuerno,
matahombres (*Ligustrum vulgare*)
Protea
Espino de fuego (*Pyrachantha coccinea*)
Rosa (*Rosa rugosa*)
Ranunculáceas

Rafiolepis (*Raphiolepis indica*)
 Cedro de Virginia (*Juniperus virginiana*)
 Ciciamor del Canadá, pata de vaca (*Cercis canadensis*)
 Secuoya (*Sequoia*)
 Rododendro, Azalea (*Rhododendrum*)
 Rosa
 Hibisco (*Hibiscus syriacus*)
 Romero (*Rosmarinus officinalis*)
 Salvia
 Secuoya
 Planta camarón (*Justicia brandegeana*)
 Becerra, boca de dragón (*Antirrhinum majus* L.)
 Picea o falso abeto (*picea*)
 Jazmín de leche (*Trachelospermum jasminoides*)
 Cola de borrego (*sedum* sp.)
 Zumaque (*Rhus coriaria*)
 Clavelinas (*Dianthus barbatus*)
 Liquidámbar, Nijtepijito (*Liquidambar styraciflua*)
 Sicomoro
 Toyón (*Heteromeles arbutifolia*)
 Campanilla, correhuela de tres colores (*convolvulus tricolor*)
 Bola de nieve, durillo viburno lúcido (*Viburnum - varios*)
 Nuez (*Juglans nigra*) (sin frutos)
 Weigela florida (*weigela florida variegata*)
 Lilo o lila (*syringa vulgaris*)
 Sauce blanco (*Salix alba*)
 Bonetero (*evonymus fortunei*)
 Genista enana (*genista tinctoria*)
 Xylosma
 Milenrama (*achillea millefolium*)
 Ipe da varzea (*tabebuia umbellata*)
 Tejo (*Taxus baccata*)
 Pino del tejo (*podocarpus macrophyllus*)
 Yuca (Yucca)
 Cuarentonas (Zinnia)

*Para saber a cuáles especies de plantas no es recomendable aplicarles el producto, consulte las "Precauciones Especiales de Uso".

Nota: Se entiende "plantas sin fruto" aquellas que no fructificarán por al menos un año luego del tratamiento.

31/36

BULBOS ORNAMENTALES

El WEED IMPEDE® puede aplicarse para controlar malezas anuales susceptibles en bulbos ornamentales, por ejemplo, narcisos, jacinto y tulipán. Aplique WEED IMPEDE® al suelo dos a cuatro semanas después de la siembra, pero antes de la emergencia de las malezas anuales. Para todos los bulbos plantados, aplique WEED IMPEDE® nuevamente en el invierno tardío o en la temprana primavera la tierra libres de maleza.

Tasas de Aplicación por Diseminación:

Época de Aplicación	Textura de la Tierra	WEED IMPEDE® Onzas fluidas/ 1,000 pies²	Tiempo Mínimo Entre Aplicaciones	Total de WEED IMPEDE® Permitido por Año Onzas fluidas/ 1,000 pies²
Otoño	Gruesa	0.5	3 Meses	1
Otoño	Media y Fina	1.0	3 Meses	2
Febrero - Marzo	Todas las Texturas	0.5	3 Meses	2

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

NO APLIQUE el producto a tulipanes que han emergido a una altura mayor de 3/4 de pulgada.

NO APLIQUE el producto a los bulbos de gladiolo antes de la emergencia o antes de que tengan menos de una pulgada de diámetro.

CÉSPEDES DE TEMPORADA CÁLIDA

El WEED IMPEDE® puede aplicarse como un tratamiento de preemergencia para el control de malezas anuales y ciertas malezas de hoja ancha en céspedes de temporada cálida ya establecidos incluyendo el pasto bahía, el pasto de las bermudas, pasto búfalo, ciempiés, grama de San Agustín, pasto zoysia y cañuela alta presente en áreas de temporada cálida. Se define el césped establecido como un césped denso que tenga un sistema de raíces bien afianzado y un crecimiento saludable y vigoroso de su parte superior. Utilice el WEED IMPEDE® sólo como parte de un programa de control total del césped que incluya buenas prácticas de fertilización.

Cualquier práctica de cultivo que altere la tierra, tal como el proceso de airear o de corte vertical, debe hacerse antes de la aplicación del WEED IMPEDE®.

El WEED IMPEDE® no controlará las malezas que ya han emergido. El control exitoso de preemergencia de malezas indicadas en esta etiqueta exige que WEED IMPEDE® sea aplicado antes de la germinación de las malezas y sea activado por una lluvia o irrigación de media pulgada de agua dentro de un lapso de 21 días de su aplicación.

El WEED IMPEDE® puede dañar el césped que no está bien establecido o que está decaído o debilitado debido a las condiciones climáticas de invierno desfavorables, la sequía, los nematodos u otros factores que dañan o debilitan los sistemas de raíces del césped. Aplique el WEED IMPEDE® sólo al césped saludable, bien establecido que tenga un sistema de raíces bien afianzado.

NO aplique el WEED IMPEDE® en la primavera o a principios de verano al césped de cañuela alta resembrado el otoño anterior.

NO lo use en otras especies de festuca.

En las áreas de pasto bermuda que ha sido resembrado con hierbas de invierno, una aplicación de WEED IMPEDE® reducirá el pasto sembrado en exceso.

Las Hierbas Anuales Controladas por WEED IMPEDE®

Anuales Veraniegas:

- Capín arroz (*Echinochloa crus-galli*)
- Zácate cangrejo velludo (*Digitaria sanguinalis*)
- Digitaria violascens
- Eleusine Indica
- Limpiabotella (*Setaria faberii*)
- Setaria macrocarpa
- Almorejo verde (*Setaria viridis* (L.) P. Beauv.)
- Setaria viridis var. robusta-purpurea
- Cola de zorro (*Setaria glauca*)
- Pata de gallina
- Sorgo de Alepo (*plantas jóvenes solamente*)
- Ballica, italiana
- Espolón, cadillo bravo

Anuales Invernales:

- Pasto azul, zácate azul (*Poa pratensis*), anual

Las Malezas Anuales de Hoja Ancha Controladas por WEED IMPEDE®

Anuales Veraniegas:

- Clavelina montes, cominillo, culantrillo, tomillo
- Sanguinaria, cien nudos (*Polygonum aviculare*)
- Verdolaga (*Portulaca oleracea*)

Anuales Invernales:

Pamplina (*Stellaria media* (L.) Vill.)
Ortiga muerta (*Lamium amplexicaule* L.)

Las Malezas Anuales de Hoja Ancha Suprimidas por WEED IMPEDE®

Hierba cana (*Senecio vulgaris*)
Sanguinaria, cien nudos (*Polygonum aviculare*)
Oxalis priceae

TASAS DE APLICACIÓN, FRECUENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA APLICACIÓN

El WEED IMPEDE® puede aplicarse en la primavera para el control de hierbas anuales veraniegas y malezas de hoja ancha; en el otoño para controlar el pasto azul o zacate azul anual y las malezas de hoja ancha.

Tasas de Aplicación por Diseminación:

Área de Uso	WEED IMPEDE® Onzas fluidas/ 1,000 pies ²	Tiempo Mínimo Entre Aplicaciones	Total de WEED IMPEDE® Permitido por Año Onzas fluidas/ 1,000 pies ²
Todas, excepto Florida	1-1.5	3 Meses	4
Florida	1	3 Meses	3

EQUIPO DE APLICACIÓN

Aplique WEED IMPEDE® uniformemente sobre el área de césped. Evite los saltos y el repaso del rociado que pueda causar una cobertura incompleta o excesiva. Para obtener los mejores resultados utilice un equipo diseñado para la diseminación uniformemente los herbicidas líquidos. Verifique el equipo frecuentemente para asegurarse que trabaja y distribuye el rociado debida y uniformemente.

RESEBRADO

Los herbicidas que controlan las malezas anuales pueden afectar el establecimiento deseable de semillas de césped. El resembrado debe demorarse por lo menos 90 a 120 días después de la aplicación de WEED IMPEDE®. Con el resembrado, es esencial que se observen las prácticas agrícolas apropiadas tales como el cultivo y la preparación de semilleros, irrigación y fertilización. Para resultados satisfactorios de resembrado luego

del uso del WEED IMPEDE® la tasa de sembrado debe aumentarse y debe utilizarse el equipo diseñado para poner a las semillas en pleno contacto con la tierra (tales como el Rogers Aero Seeder).

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Para evitar las posibles lesiones, NO aplique WEED IMPEDE® a:

- Especies de césped de temporada fresca (pasto azul o zacate azul, festuca, gramíneas agrostis, etc.)
- Áreas de pequeñas estaquitas o cuadraditos de césped nuevos de pasto bermuda, grama de San Agustín, ciempiés, o pasto zoysia hasta que estos céspedes no estén bien establecidos y con sistemas de raíces bien afianzados.
- Nuevas áreas de pasto bermuda que se le ha agregado abono orgánico con agua, hasta que éstas áreas no estén bien establecidas.
- La variedad de pasto bermuda "Sun Turf" cuando el WEED IMPEDE® es mezclado en el tanque con atrazina.

ÁREAS NO PLANTADAS

Se pueden utilizar mezclas de tanque de WEED IMPEDE® más REMUDA® FULL STRENGTH o ROUNDUP® para controlar la vegetación indeseable en áreas no plantadas tales como los bordes de las carreteras, derechos de paso, etc. Cuando se aplica según las instrucciones de uso, estas mezclas de tanque darán control de las malezas susceptibles indicadas en las correspondientes etiquetas de producto. Consulte las etiquetas de mezcla de producto en el tanque para informarse de las instrucciones de usos específicos, las precauciones y limitaciones antes de su utilización.

Tasas de Aplicación por Diseminación:

Duración del Control	WEED IMPEDE® Onzas fluidas/ 1,000 pies ²	Tiempo Mínimo Entre Aplicaciones	Total de WEED IMPEDE® Permitido por Año Onzas fluidas/ 1,000 pies ²
2 a 4 Meses	1.5	2 Meses	6
8 a 12 Meses	4.5	8 Meses	9

35/
36

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO CONTAMINE EL AGUA, LA COMIDA O EL FORRAJE CON EL ALMACENAMIENTO O ELIMINACIÓN.

ALMACENAMIENTO: Debe almacenarse en el recipiente original en un área fresca, bien ventilada, inaccesible a los niños y a las mascotas. Almacene por encima de 40°F.

ELIMINACIÓN DE LOS RECIPIENTES: Si está vacío: No reutilice este recipiente. Coloque en la basura u ofrézcalo para ser reciclado, si ésta opción está disponible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia de eliminación de desperdicios sólidos para obtener instrucciones acerca de cómo proceder. Nunca vierta producto no utilizado en ningún drenaje interno o externo.

CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

Lawn and Garden Products, Inc. garantiza que este producto concuerda con la descripción química en la etiqueta y que es razonablemente adecuado para los fines allí afirmados cuando se utiliza conforme a las instrucciones de uso bajo condiciones normales. Lawn and Garden Products, Inc. no establece, ni autoriza a ningún agente o representante a establecer ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluyendo la idoneidad o que se ajusta a los propósitos para los cuales se vende.

Se cree que las instrucciones para el uso de este producto son confiables y deben seguirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos inherentemente relacionados con el uso de este producto. Daño a las plantas, ineficacia u otras consecuencias imprevistas pueden resultar de tales factores como la oportunidad y el método de aplicación, el clima y las condiciones de la planta, la presencia de otros materiales, u otros factores de peso, todos los cuales están fuera del control de Lawn and Garden Products, Inc. y del vendedor. Al grado consecuente con la ley pertinente, el comprador y el usuario reconocen y asumen todos los riesgos y responsabilidades que resulten del manejo, almacenamiento y uso del material que no esté estrictamente de acuerdo con las instrucciones que aquí se dan. En ningún caso será responsable Lawn and Garden Products, Inc. o el vendedor responsables por daños consecuentes, especiales, indirectos o incidentales, o pérdidas causadas por el manejo o uso de este producto. Los términos precedentes son una condición de venta por Lawn and Garden Products, Inc. y el Comprador los acepta como tales.

(Blazon® - Milliken Chemical)
(Roundup® - Monsanto)
(Gallery® - DowAgroSciences LLC).

31

36
36

WEED IMPEDE®



For Homeowner Use/Solamente Para Uso

ACTIVE INGREDIENT:	
Oryzalin: 3,5-dinitro-N ⁴ ,N ⁴ -dipropylsulfanilamide.....	40.40%
OTHER INGREDIENTS:	59.60%
TOTAL.....	100.00%

Contains 1 pound of active ingredient per quart.
© Registered Trademark of Lawn and Garden Products, Inc.

EPA Reg. No. 54705-5 EPA Est. No. 48498-CA-1

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

CAUTION/PRECAUCIÓN

*(See booklet for Precautionary Statements,
Directions For Use & Storage and Disposal/
Vea el folleto para Advertencias, Instrucciones
Para el Uso y Almacenamiento y Eliminación)*

Manufactured for / Fabricado por:
LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.
P.O. Box 35000 • Fresno, CA 93745
(559) 499-2100 • www.montereylawngarden.com

NET CONTENTS: 1 QUART / 946 mL

▲
PEEL BACK BOOK HERE / JALE AQUÍ PARA ABRIR